

เอื้องทับทิมเขาพ่อตา

ชื่ออื่นๆ :

Bulbophyllum australe (Seidenf.) J.J.Verm., Schuit. & de Vogel

ช่วงระยะออกดอก : กุมภาพันธ์-เมษายน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย ขนาดเล็ก เจริญทางข้าง มีเหง้าทอดเลื้อย ปล้องสั้นๆ ประมาณ 2 ซม. มีลำลูกกล้วยเกิดที่ข้อเหง้า รูปไข่ เป็นร่องตามยาว ยาวประมาณ 7-9 มม. มีใบ 1 ใบติดที่ปลายลำ มีก้านใบ ยาว 5-7 มม. **ช่อดอก** ออกจากโคนลำ ผอม ยาวประมาณ 25 ซม. มีกาบหุ้มก้านช่อ 5-6 กาบ ซ้อนทับกัน แขนงช่อดอก ยาว 3-5 ซม. ดอกย่อย 8 – 12 ดอก ออกหลวมๆ ออกเรียงสลับ มีใบประดับที่ติดทนนาน รูปสามเหลี่ยมยาว ปลายเรียวแหลม ยาวเกินครึ่งไข่ ส่วนโคนหุ้มข้อก้านดอกและแกนก้านดอก **ดอก** สีครีมถึงเหลือง มีเส้นลายดอกสีม่วง พาดตามความยาวกลีบ **กลีบเลี้ยงบน** รูปใบหอกแกมไข่ ขนาด 3.75x7 มม. ปลายหู่ สีครีม มีลายเส้นสีม่วง 5 เส้น **กลีบเลี้ยงคู่ล่าง** รูปใบหอก เบี้ยว ปลายหู่ ขนาด 2.5x8 มม. ขอบกลีบด้านข้างมักพับม้วนตามยาว สีครีมอมม่วงจางๆ มีลายเส้นสีม่วง 5 เส้นพาดตามยาว **กลีบดอก** รูปใบหอกแกมสามเหลี่ยม ปลายหู่ ขนาด 1.9x4.6 มม. สีครีม มีลายแถบสีม่วง 1 เส้นพาดตามยาวกลางกลีบ ขอบกลีบจักฟันเลื่อย ไม่สม่ำเสมอ กางออกเฉียงขึ้นบนเลยแนวระนาบ **กลีบปาก** รูปหัวใจแกมสามเหลี่ยม ปลายกลมมน โคนรูปหัวใจ สีครีม มีชั้นเนื้อเยื่อสีเหลือง รูปกะเปาะพาดตามยาวกลางกลีบ โดยส่วนโคนกะเปาะที่ค่อนข้างกลมมน อยู่ส่วนปลายกลีบปาก มีเส้นสีม่วงจางๆ พาดตามยาว ขนานกับแนวกะเปาะดังกล่าว ฝั่งละ 1 เส้น เล้าเกสร ขนาด 1x3 มม. โค้งมาหน้าเล็กน้อย

ถิ่นที่อยู่ : พบตามพื้นป่าในป่าดิบเขา ตั้งแต่ 1,000 เมตร