



สิงโตตกคู่

ชื่ออื่นๆ : สิงโตคู่

Bulbophyllum biflorum Teijsm. & Binn.

ช่วงระยะออกดอก : เมษายน-มิถุนายน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อย ระยะห่างยาว 1-1.5 ซม. ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ ผิวเป็นร่องและสัน **ใบ** จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 2-3 ซม. ยาว 10-13 ซม. ปลายใบมน **ช่อดอก** ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อซี่ร่ม จำนวน 2 ดอก **ดอก** บานเต็มที่ยาว 7-8 ซม. **กลีบเลี้ยงกลาง** รูปไข่ สีม่วงแกมน้ำตาล ปลายกลีบยาวเรียว **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** สีเขียวแกมเหลือง มีจุดสีม่วงแดงกระจาย ปลายกลีบสีเหลือง **กลีบดอก** รูปรี ปลายกลีบเรียว ยาว **กลีบปาก** หนา สีเหลืองชุน มีจุดสีม่วงกระจายอยู่ทั่วกลีบปาก



ถิ่นที่อยู่ : พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 100-500 เมตร จากระดับน้ำทะเล

