



เอื้องโรย

Bromheadia aporoides Rchb.f.

อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว ความสูงจากระดับน้ำทะเล 300 - 1,600 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก มีนาคม - เมษายน

กล้วยไม้อิงอาศัย สูงถึง 15 เซนติเมตร เหง้าสั้น เลื้อย ลำต้นเป็นกระจุก ปล้องยาว ส่วนโคนมีกาบหุ้ม 2-4 อัน ใบยาว 3-7 ใบแบนทั้งสองด้าน กาบยาวกว่าปล้องเล็กน้อย แผ่นใบแข็งคล้ายหนัง เรียงเป็นเส้นตรงคล้ายหอกถึงเส้นตรง โคนเล็กน้อยหรือบางครั้งโค้งมาก กว้าง $2.5-7 \times 0.4-0.6$ เซนติเมตร ปลายแหลม ช่อดอกสั้นมาก ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร มักไม่แตกกิ่ง ใบประดับซ้อนทับกันแน่นและโอบล้อมแกนกลาง รูปเรือ รูปไข่เมื่อแบน ยาว 4-6 มิลลิเมตร ไม่มีขนดอกสีครีมหรือสีขาว บานพร้อมกัน 1-2 ดอก กลีบเลี้ยงรูปขอบขนานถึงรูปหอก เว้าเล็กน้อย ปลายแหลมแหลม กลีบเลี้ยงด้านข้างโค้งเล็กน้อย กลีบดอกรูปวงรีถึงรูปขอบขนานรูปหอก ปลายแหลม แผ่นใบมีขนกระจัดกระจายและมีแถบตรงกลางยื่นไปถึงโคนกลีบ กลีบข้างแยกจากกัน กลีบกลางรูปรีถึงรูปทรงกลม ส่วนกลางมีแถบสีเหลืองมีปุ่มนูน ปลายกลีบมนถึงมีติ่งแหลม โคนเล็กน้อย ขอบหยักเป็นคลื่น อับเรณูรูปรีเล็กน้อย กระจายพันธุ์ในลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ บอร์เนียว ประเทศไทยพบในป่าเต็งรังและป่าดิบเขาตอนล่าง ระดับความสูงประมาณ 300-1,600 เมตร