



## สิงโตสยาม

ชื่ออื่นๆ :

*Bulbophyllum lobbii* subsp. *siamense* (Rchb.f.) Mangal, F.Velazquez & J.J.Verm.

ช่วงระยะออกดอก : มีนาคม-สิงหาคม

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ ยาว 3-5 ซม. เรียงห่างๆ กัน ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 15-20 ซม. ปลายแหลม โคนเรียวสอบ แผ่นใบหนา **ช่อดอก** ออกตามข้อของเหง้า มีดอกเดี่ยว ก้านดอกยาวได้ถึง 10 ซม. ดอก สีเหลืองครีม มีเส้นสีม่วงแดงตามยาว **กลีบเลี้ยงบน** รูปใบหอก ยาวได้ถึง 5 ซม. **กลีบคู่ข้าง** ขนาดเท่าๆ กลีบบน โคนหยักเว้า ปลายกลีบชี้ลง **กลีบดอก** กลีบข้างแคบ และสั้นกว่ากลีบเลี้ยงเล็กน้อย กางออก **กลีบปาก** สีเหลือง รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1 ซม. มีจุดประสีม่วงแดงกระจาย กลีบม้วน ปลายแหลมชี้ลง โคนกลีบมีแต้มสีเหลืองเข้ม เส้นเกสรแผ่กว้าง สีเหลือง มีเส้นสีม่วงแดงตามยาว



**ถิ่นที่อยู่ :** พบที่อินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู สุมาตรา ชวา บอร์เนียว และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามคืบไม้ในป่าดิบเขา และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 1,400 เมตร