

# สิงโตໄໝປລາຕອກຈິວ

ชื่ออื่นๆ :

*Bulbophyllum minutulum* Ridl.

ช่วงระยะออกดอก : มีนาคม-พฤศจิกายน

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญด้านข้าง เหง้าทอดเลื้อย ปล้องละ 2.5 มม. เกิดเป็นลำลูกกล้วย ลำลูกกล้วยรูปขอบขนานแบน มักเอนนอนแนบชิดไปกับเหง้า ยาวประมาณ 2.5 มม. ทำให้เมื่อมองจากด้านบนดูเหมือนลำลูกกล้วยเรียงต่อหัวต่อท้ายกัน แต่ละลำลูกกล้วยมี 1 ใบ ออกจากตา ก่อนถึงยอดลำ **ใบ** รูปรี ปลายแหลม คล้ายแผ่นหนัง ขนาด 2 x 5 มม. **ดอก** เดี่ยว ออกที่ฐานลำลูกกล้วย ก้านช่อและก้านดอก เล็ก เรียว ยาว 2.2-3 ซม. มีใบประดับรูปกล้วยหุ้มระหว่างรอยต่อก้านช่อและก้านดอก ดอกบานกลางวัน หุบกลางคืน ได้หลายวัน **กลีบเลี้ยงบน** ยาว 3-3.5 มม. กว้าง มากกว่า 1 มม. เล็กน้อย สีเหลืองซีดที่ปลายกลีบ สีส้มซีดที่ฐานกลีบ มีสายเส้นสีส้ม 3 เส้นที่ฐาน **กลีบเลี้ยงคู่ล่าง** ค่อนข้างโค้ง ยาวกว่ากว้างกว่าเล็กน้อย สีเหมือนกัน **กลีบดอก** รูปขอบขนาน ปลายเรียว ขนาด 0.5x1.5 มม. สีส้ม **กลีบปาก** ขนาด 0.8x2 มม. มองจากมุมบนจะเป็นรูปรี ปลายแหลม สีส้ม ปลายกลีบแต้มสีเหลือง ฐานกลีบปากโค้งพับไปเชื่อมกับฐานเส้าเกสร ปลายเส้าเกสร มีรยางค์ยื่นยาวขึ้นมาเหนือฝาปิดอับเรณู

**ถิ่นที่อยู่ :** พบตามต้นไม้ที่มีมอสส์ปกคลุมในป่าดิบเขา ระดับต่ำ-สูง ตั้งแต่ 800 เมตร

