



# สิงโตคอแพ้ว

ชื่ออื่นๆ :

*Bulbophyllum mirum* J.J.Sm

ช่วงระยะออกดอก : เมษายน-มิถุนายน

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** กล้ายไม้อิงอาศัย เจริญด้านข้าง เหง้าทอดเลื้อย ปล้องละ 25 มม. เกิดเป็นลำลูกกล้วย ลำลูกกล้วยรูปไข่ถึงรูปกรวย ยาวประมาณ 2 ซม. บางครั้งเป็นเหลี่ยม 4 ด้าน ผิวเป็นมัน ใบ เดี่ยวออกที่ปลายลำ รูปไข่แกมขอบขนาน ก้านใบสั้น แต่ลำลูกกล้วยมี 1 ใบ ใบอวบน้ำ ขนาด 2.3-2.5x5.5-7 ซม. **ช่อดอก** ออกที่ฐานลำลูกกล้วย ยาว 1.5-2.6 ซม. มี 2 ดอกต่อช่อ มีใบประดับรูปใบหอก ปลายเรียวแหลม ขนาดใหญ่ สีครีม หุ้มที่โคนก้านดอก **ดอก** สีขาวมีจุดประสีแดง **กลีบเลี้ยงบน** รูปไข่ ยาว 13 มม. **กลีบเลี้ยงคู่ล่าง** รูปใบหอก ยาว 35 มม. ขอบกลีบของทั้งสองเชื่อมต่อกัน เกิดเป็นหลอดรูปกรวยแคบๆ **กลีบดอก** ขนาดเล็ก รูปครึ่งวงกลม มีรยางค์คล้ายเกล็ดบางๆ ยาวประมาณ 5 มม. สีม่วงปลายขาว กลีบละ 12-20 เส้นยื่นออกมา **กลีบปาก** รูปขอบขนานแกมไข่ กว้างที่ส่วนปลาย ปลายเส้าเกสรมีรยางค์รูปลิ้มแคบยื่นตั้งตรงขึ้นมาเลยฝาปิดอับเรณู



**ถิ่นที่อยู่ :** พบตามต้นไม้ที่มีมอสส์ปกคลุมในป่าดิบเขาระดับต่ำ-สูง ตั้งแต่ 800 เมตร