



# เอื้องห่มใบเว้า

ชื่ออื่นๆ :

*Bryobium retusum* (Blume) Y.P.Ng & P.J.Cribb

ช่วงระยะออกดอก : มีนาคม-เมษายน

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง มีเหง้าสั้นๆ ปล้องสั้นๆ มีลำลูกกล้วยขึ้นชิดติดกันรูปไข่ถึงรูปขอบขนาน มีกาบคล้ายกระดาษหุ้มคาวอยู่ ขนาด 0.9 x 1.2 ซม. มักมีใบ 2 ใบติดอยู่ที่ปลายลำ ใบ รูปหอกแกมขอบขนาน ขนาด 0.9 x 7.5 ซม. หนา อวบน้ำ มีร่องกลางใบตามยาว ฐานใบสอบแคบ ก้านใบหนา สั้น ปลายใบมน บรรจบไม่เท่ากันเป็น 2 พู ดอก ออกเป็นช่อจากข้อของ ลำลูกกล้วยส่วนปลาย มีได้ถึง 3 ช่อต่อลำ ช่อดอก ยาว 1.5 ซม. มีขนยาวสีขาวคล้ายขนสัตว์ ปกคลุม ก้านช่อดอก 0.8 ซม. มีกาบรูปขอบขนาน ปลายแหลม โค้งเป็นอุ้งมือปกคลุมต่างๆ โคนก้านดอกย่อยมีใบประดับรูปสามเหลี่ยม เกือบถึง ปลายแหลม ยาว 0.27 ซม. รังไข่ยาว 0.15 ซม. มีขนอ่อนนุ่มปกคลุม ดอกย่อย สีเขียวซีด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 ซม. กลีบเลี้ยง รูปไข่แกมขอบขนาน ขนาด 0.1 x 0.2 ซม. กลีบกางออก ปลายเกือบแหลม มีขนคล้ายใยแมงมุมปกคลุม กลีบดอก รูปใบหอก ขนาด 0.05 x 0.17 ซม. ปลายทู่ กลีบปาก รูปสามเหลี่ยมแกมไข่ ขนาด 0.1 x 0.1 ซม. เป็นร่องตามยาว เส้าเกสรสั้น ฝักปิดอับเรณู สีเหลือง คางดอกสั้น โค้งกลับหลัง



ถิ่นที่อยู่: พบตามต้นไม้ในป่าดิบชื้นระดับต่ำ ป่าดิบใกล้ชายฝั่งทะเล

