



สิงโตໄໝປລາປາກມນ

ชื่ออื่นๆ : สิงโตໄໝປລາໄບມນ

Bulbophyllum ovalifolium (Blume) Lindl.

ช่วงระยะออกดอก : สิงหาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้ายไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ รูปทรงกลม ถึงรูปทรงกระบอก ยาว 4-6 มม. ขึ้นชิดกันบนเหง้า ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปไข่ หรือรูปรี จนถึงเกือบกลม กว้าง 2.6-5 มม. ยาว 3-6 มม. ปลายใบมน **ช่อดอก** ดอกเดี่ยว ออกที่โคนลำลูกกล้วย ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.8-1 ซม. สีเหลืองแกมเขียวถึงสีส้มแกมแดง ขอบกลีบเลี้ยงมีขนสั้น **กลีบเลี้ยงกลาง** รูปไข่แกมขอบขนาน **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** รูปไข่กว้าง **กลีบดอก** รูปไข่ **กลีบปาก** รูปไข่กลับ อวบหนา มีตุ่มขรุขระจำนวนมาก เส้าเกสรสั้น



ถิ่นที่อยู่ : พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 800-1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล