



เอื้องเงาแพะศาคอเทึก

Cleisostoma scortechinii (Hook.f.) Garay

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จ.สตูล ความสูงจากระดับน้ำทะเล 0 - 600 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก มิถุนายน - สิงหาคม

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด รากกิ่งอากาศ ต้นยาวโค้งห้อยขนานกับพื้นดิน ใบ เรียงตัวสลับรูปขอบขนานแกมรูปรี แผ่นใบหนาคล้ายหนัง ผิวสัมผัสไม่เรียบ โคนใบติดกับก้านใบ ปลายใบเป็นติ่งแหลมสั้นๆ ใบคอดลดขนาดก่อนถึงปลายใบ ช่อดอก กลมแข็ง ห้อยลง เกิดที่ข้อก่อนไปทางยอด ไม่ค่อยแตกแขนง ก้านช่อดอกสีเขียวอ่อน แกนช่อดอกสีขาว ดอกในช่อมีมากทยอยบานสู่ปลายช่อ ดอกบานทนหลายวัน ระยะห่างระหว่างดอกสม่ำเสมอ ใบประดับดอกแหลม สีขาวครีม แนบติดกับก้านดอกย่อย ก้านดอกย่อยสีขาวหรือสีเขียวอ่อน กลีบเลี้ยงบนและกลีบดอกเกือบทั้งหมดสีม่วงเข้มหรือม่วงแกมน้ำตาล กลีบเลี้ยงบน รูปไข่กลับ ตัวกลีบตั้งชัน ปลายโค้งไปข้างหน้า อาจมีหรือไม่มีแถบสีเหลืองแกมเขียวอ่อนพาดกลางกลีบ กลีบเลี้ยงคู่ข้าง รูปไข่กลับ ไม่สมมาตร ขอบและกลางกลีบพาดด้วยแถบสีเหลืองแกมเขียวอ่อน เมื่อดอกแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม ขนาดของกลีบใกล้เคียงกับกลีบเลี้ยงบน กลีบดอกช่อดอกข้าง รูปไข่กลับแกมขอบขนาน สีเข้มกว่ากลีบเลี้ยง เดี่ยวสีขาว ชี้ลง เนื้อเยื่อผนังกันภายในเดียวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีเขียวแกมเหลืองอ่อน สามารถมองเห็นได้จน ทางด้านหน้าของดอก หูกลีบปากสั้น รูปสามเหลี่ยม สีเหลืองอ่อน แรกๆ ดอกบานโค้งเข้า เมื่อดอกเริ่มแก่โค้งออก ระหว่างหูกลิบ ทั้งสองมีกลุ่มเนื้อเยื่อสีเหลืองอ่อนพาดข้างละ 1 กลุ่ม ตลอดความกว้างของฐานหูกลิบปากช่วงปลายกลีบปากรูปหัวลูกศรสีม่วงอ่อนฐานมีกลุ่มเนื้อเยื่อ 2 กลุ่ม บริเวณถัดจากกลุ่มเนื้อเยื่อของหูกลิบปากสีม่วงอ่อน ปลายกลีบปากมนสีขาว เส้าเกสรสีขาว พบในที่ราบลุ่มและป่าพรุ