



เอื้องเขาเพชรก่อเทือก

ชื่ออื่นๆ :

Cleisostoma scortechinii (Hook.f.) Garay

ช่วงระยะออกดอก : มิถุนายน-สิงหาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด รากกิ่งอากาศ ต้นยาวโค้งห้อยขนานกับพื้นดิน เส้นผ่านศูนย์กลางต้นประมาณ 0.5 ซม. หุ้มด้วยกาบใบตลอด ปล้องยาว 2-3 ซม. **ใบ** เรียงตัวสลับรูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 2.2-2.6 ซม. ยาว 12-15 ซม. แผ่นใบหนาคล้ายหนัง ผิวสัมผัสไม่เรียบ โคนใบต่อกับก้านใบ ยาว 1 ซม. หรือน้อยกว่า ปลายใบเป็นติ่งแหลมสั้นๆ ใบคอดลดขนาดก่อนถึงปลายใบ ประมาณ 1-1.5 ซม. **ช่อดอก** กลมแข็ง ห้อยลง เกิดที่ข้อค่อนไปทางยอด ไม่ค่อยแตกแขนง ก้านช่อดอกสีเขียวอ่อน ยาว 1.5-2 ซม. แกนช่อดอกสีขาว ยาว 7-16 ซม. **ดอก** ในช่อมีมาก ทอยบานสู่ปลายช่อ ดอกบานทนหลายวัน ระยะห่างระหว่างดอกสม่ำเสมอ ใบประดับดอกแหลม สีขาวครีม แนบติดกับก้านดอกย่อย ก้านดอกย่อยสีขาวหรือสีเขียวอ่อน ยาว 0.4 ซม. ดอกบานกว้าง 1.1 ซม. ยาว 1 ซม. **กลีบเลี้ยงบนและกลีบดอก** เกือบทั้งหมดสีม่วงเข้มหรือม่วงแกมน้ำตาล **กลีบเลี้ยงบน** รูปไข่กลับ กว้าง 0.25 ซม. ยาว 0.45 ซม. ตัวกลีบตั้งขึ้น ปลายโค้งไปข้างหน้า อาจมีหรือไม่มีแถบสีเหลืองแกมเขียวอ่อน พาดกลางกลีบ **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** รูปไข่กลับ ไม่สมมาตร ขอบและกลางกลีบพาดด้วยแถบสีเหลืองแกมเขียวอ่อน เมื่อดอกแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม แถบตรงกลางกว้างประมาณ 0.1 ซม. ขนาดของกลีบใกล้เคียงกับกลีบเลี้ยงบน **กลีบดอก** ช่อดอกข้าง รูปไข่กลับแกมขอบขนาน กว้าง 0.15 ซม. ยาว 0.35 ซม. สีเข้มกว่ากลีบเลี้ยง ความยาวจากปลายเดือยถึงปลายกลีบปาก 0.8 ซม. เดือยสีขาว ชี้ลง กว้าง 0.25 ซม. ยาว 0.45 ซม. เนื้อเยื่อผนังกันภายในเดือยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีเขียวแกมเหลืองอ่อน สามารถมองเห็นได้จากทางด้านหน้าของดอก หูกลิบบากสั้น รูปสามเหลี่ยม สีเหลืองอ่อน แรกๆ ดอกบานโค้งเข้า เมื่อดอกเริ่มแก่ออก ระหว่างหูกลิบบากทั้งสองมีกลุ่มเนื้อเยื่อสีเหลืองอ่อนพาดข้างละ 1 กลุ่ม ตลอดความกว้างของฐานหูกลิบบากช่วงปลาย **กลีบปาก** รูปหัวใจรูปครุ สีม่วงอ่อนฐานมีกลุ่มเนื้อเยื่อ 2 กลุ่ม บริเวณถัดจากกลุ่มเนื้อเยื่อของหูกลิบบากสีม่วงอ่อน ปลายกลีบปากมน สีขาว เส้นกลางสีขาว



ถิ่นที่อยู่ : ในที่ราบลุ่มและป่าพรุ ที่ระดับความสูงถึง 600 เมตร จากระดับน้ำทะเล

