



เอื้องล้มป๊ะ

ชื่ออื่นๆ : พวงชมพู

Cleisostoma williamsonii (Rchb.f.) Garay

ช่วงระยะออกดอก : พฤษภาคม-กรกฎาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นพอมยาวเรียวและห้อยลง ใบ รูปทรงเหมือนลำต้น ปลายใบแหลม **ช่อดอก** ห้อยลง ก้านช่อสั้นกว่าแกนช่อ บางครั้งช่อแยกแขนง **ดอก** สีชมพู ขนาด 0.5 ซม. **กลีบเลี้ยง** รูปไข่ ปลายมน **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** รูปขอบขนาน **กลีบดอก** รูปไข่ ปลายมนเล็กและเรียวกว่ากลีบเลี้ยงบน เมื่อดอกบานเต็มที่ กลีบทั้งห้าลุ้ไปทางด้านหลัง **กลีบปาก** มีขนาดเล็กและจุ่มเข้าด้านใน เนื้อเยื่อบนผนังด้านในของกลีบปากเป็นรูปตัวที เดี่ยวดอกสั้น ปลายมน



ถิ่นที่อยู่ : พบในป่าดิบเขาและป่าเต็งรัง ตามที่โล่งแจ้งแสงแดดจัด ที่ความสูง 800-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล