



เอื้องเหินหอบาง

Coelogyne septemcostata J.J.Sm.

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส ความสูงจากระดับน้ำทะเล 50 - 2,300 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก มีนาคม - พฤษภาคม

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางช้าง รากฝอยกิ่งรากอากาศ ต้นเป็นเหง้าสั้น ลำลูกกล้วยรูปไข่อยู่ชิดติดกัน สีเขียวกว้าง 2-2.5 เซนติเมตร ยาว 5-6 เซนติเมตร ลำลูกกล้วยแก่เกิดร่องและทึงใบ แต่ละลำลูกกล้วยมีใบเพียง 1 ใบ ใบ รูปรี ปลายใบแหลมแผ่นใบโค้งไม่เรียบ เส้นใบขนาน ขอบใบหยัก กว้างได้ถึง 10 เซนติเมตร ความยาวรวมทั้งก้านใบ ยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร ช่อดอก แบบช่อกระจจะ เกิดที่ยอดของแขนงใหม่ที่ใบเจริญไปพร้อมๆ กับดอก ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 12 เซนติเมตร แกนช่อดอกมี 2-3 ข้อ ดอกบานครั้งละหนึ่งดอก มีกลิ่นหอมแต่บานไม่ทน กลีบดอก สีเหลืองอมเขียวอ่อน ดอกบานกว้าง 6.2 เซนติเมตร ยาว 4.3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงบน รูปรีแกมรูปไข่กลับ ปลายแหลม ตรงกลางกลีบเป็นร่อง กว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 4.6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงคู่ข้าง รูปขอบขนาน ปลายแหลม ตรงกลางเป็นร่อง กว้าง 1.9 เซนติเมตร ยาว 4.7 เซนติเมตร กลีบดอกรูปแถบปลายเรียวแหลม กว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 4.8 เซนติเมตร กลีบปาก ขนาดใหญ่ โค้ง กว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 4.5 เซนติเมตร ด้านนอกสีเหลืองอมเขียวอ่อน ทุกกลีบปากตั้งขึ้น กว้าง 2.5 เซนติเมตร สูง 1.5 เซนติเมตร ขอบสีขาว ม้วนตัวออก ผนังด้านในสีน้ำตาลอ่อน ระหว่างทุกกลีบปากมีสันสีขาวนูน 5-7 สัน แต่ละสันยาวไม่เท่ากันพาดจากฐานกลีบปาก โคนแต่ละสันมีขนสีส้มแดง ปลายสันขนสีน้ำตาลเข้ม สันกลางและสันข้างจะสิ้นสุดที่ฐานของปลายกลีบปาก ส่วนอีกสองสันจะพาดผ่าน เข้ามาจนถึงบริเวณกึ่งกลางของปลายกลีบปาก กลีบปาก รูปเกือบกลม สีน้ำตาลเข้ม ปลายสีขาวโค้งงอลง ขอบหยักเป็นริ้วสีน้ำตาล ตรงกลางนูน แต้มด้วยสีน้ำตาล เล้าเกสรรูปช้อน สีเหลืองอมเขียวอ่อน ยื่นตัวโค้ง ฐานมีแถบสีน้ำตาลพาด กว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาว 3.7 เซนติเมตร ขอบของยอดเกสรเพศเมียสีน้ำตาล บางและแผ่ออก ฝักรอบกลุ่มอับเรณูสีออกเหลือง ครอบกลุ่มอับเรณูขนาดใหญ่ สีเหลืองเข้ม 4 กลุ่ม พบตามป่าที่ราบลุ่มที่มีร่มเงาและความชื้น มักพบบนกิ่งของ ต้นไม้ที่ยืนเหนือแม่น้ำและลำธาร