




เอื้องเทียนใบบาง

ชื่ออื่นๆ :

Coelogyne septemcostata J.J.Sm.

ช่วงระยะออกดอก : มีนาคม-พฤษภาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง รากฝอยกิ่งรากอากาศ ต้นเป็นเหง้าสั้น ลำลูกกล้วยรูปไข่อยู่ชิดติดกัน สีเขียวกว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 5-6 ซม. ลำลูกกล้วยแก่เกิดร่องและทิ้งใบ แต่ละลำลูกกล้วยมีใบเพียง 1 ใบ ใบ รูปรี ปลายใบแหลม แผ่นใบโค้งไม่เรียบ เส้นใบขนาน ขอบใบหยัก กว้างได้ถึง 10 ซม. ความยาวรวมทั้งก้านใบ ยาวได้ถึง 30 ซม. **ช่อดอก** แบบช่อกระจุก เกิดที่ยอดของแขนงใหม่ที่ใบเจริญไปพร้อมๆ กับดอก ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 12 ซม. แกนช่อดอกมี 2-3 ข้อ **ดอก** บานครั้งละหนึ่งดอก มีกลิ่นหอมแต่บานไม่ทน **กลีบดอก** สีเหลืองอมเขียวอ่อน ดอกบานกว้าง 6.2 ซม. ยาว 4.3 ซม. **กลีบเลี้ยงบน** รูปรีแกมรูปไข่กลับ ปลายแหลม ตรงกลางกลีบเป็นร่อง กว้าง 2.5 ซม. ยาว 4.6 ซม. **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** รูปขอบขนาน ปลายแหลม ตรงกลางเป็นร่อง กว้าง 1.9 ซม. ยาว 4.7 ซม. กลีบดอกรูปแถบปลายเรียวแหลม กว้าง 0.3 ซม. ยาว 4.8 ซม. **กลีบปาก** ขนาดใหญ่ โค้งกว้าง 2 ซม. ยาว 4.5 ซม. ด้านนอกสีเหลืองอมเขียวอ่อน หูกลีบปากตั้งขึ้น กว้าง 2.5 ซม. สูง 1.5 ซม. ขอบสีขาว ม้วนตัวออก ผนังด้านในสีน้ำตาลอ่อน ระหว่างหูกลีบปากมีสันสีขาวนูน 5-7 สัน แต่ละสันยาวไม่เท่ากันพาดจากฐานกลีบปาก โคนแต่ละสันมีขนสีส้มแดง ปลายสันขนสีน้ำตาลเข้ม สันกลางและสันข้างจะสิ้นสุดที่ฐานของปลายกลีบปาก ส่วนอีกสองสันจะพาดผ่านเข้ามาจนถึงบริเวณกึ่งกลางของปลายกลีบปาก **กลีบปาก** รูปเกือบกลม สีน้ำตาลเข้ม ปลายสีขาวโค้งงอลง ขอบหยักเป็นริ้วสีน้ำตาล ตรงกลางนูน ตัดด้วยสีน้ำตาล เล้าเกสรรูปช้อน สีเหลืองอมเขียวอ่อน ยื่นตัวโค้ง ฐานมีแถบสีน้ำตาลพาด กว้าง 0.5 ซม. ยาว 3.7 ซม. ขอบของยอดเกสรเพศเมียสีน้ำตาล บางและแผ่ออก ฝากรอบกลุ่มอัษฎาสีออกเหลือง ครอบกลุ่มอัษฎาขนาดใหญ่ สีเหลืองเข้ม 4 กลุ่ม



ถิ่นที่อยู่ : พบตามป่าที่ราบลุ่มที่มีร่มเงาและความชื้น มักพบบนกิ่งของต้นไม้ที่ยืนเหนือแม่น้ำและลำธาร ที่ระดับความสูง 50-2,300 เมตร

