



เอื้องเหียนปากดำ

Coelogyne brachyptera Rchb.f.

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปรีวรรต จ.พังงา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 200 - 500 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก มีนาคม - เมษายน

กล้วยไม้อิงอาศัยหรืออาศัยบนหิน เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยเรียวยาว มี 4 สัน ใบ จำนวน 2 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบพับจีบ รูปรีถึงรูปใบหอก กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 17-28 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายลำลูกกล้วย แบบช่อกระจุก จำนวน 2-7 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 4-6 เซนติเมตร สีเขียวแกมเหลือง กลีบปากสีขาวมีแต้มสีเขียวเข้มเกือบดำ เส้าเกสรสีเขียว มีแต้มจุดสีน้ำตาลแดงที่โคน กลีบเลี้ยงกลาง รูปไข่ถึงรูปใบหอก กลีบเลี้ยงคู่ข้าง รูปขอบขนานถึงรูปใบหอก กลีบดอก รูปแถบ กลีบปาก รูปไข่ ปลายแผ่ออก ขอบกลีบปากจักเป็นครุยและหยักเป็นคลื่น ตรงกลางกลีบมีสัน 3 สัน พบตามป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบ