

เอื้องเทียนปากดำ

ชื่ออื่นๆ : เอื้องเทียน เอื้องลำเทียน

Coelogyne brachyptera Rchb.f.

ช่วงระยะออกดอก : มีนาคม-เมษายน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม่อิงอาศัยหรืออาศัยบนหิน เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยเรียวยาว มี 4 สัน ใบ จำนวน 2 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบพับจีบ รูปร่างรูปใบหอก กว้าง 3-5 ซม. ยาว 17-28 ซม. ปลายใบแหลม **ช่อดอก** ออกที่ปลายลำลูกกล้วย แบบช่อกระจุก จำนวน 2-7 ดอก **ดอก** บานเต็มที่กว้าง 4-6 ซม. สีเขียวแกมเหลือง กลีบปากสีขาว มีแต้มสีเขียวเข้มเกือบดำ เส้าเกสรสีเขียว มีแต้มจุดสีน้ำตาลแดงที่โคน **กลีบเลี้ยงกลาง** รูปไข่ถึงรูปใบหอก **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** รูปขอบขนานถึงรูปใบหอก **กลีบดอก** รูปแถบ **กลีบปาก** รูปไข่ ปลายแผ่ออก ขอบกลีบปากจักเป็นครุย และหยักเป็นคลื่น ตรงกลางกลีบมีสัน 3 สัน

ถิ่นที่อยู่ : พบตามป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่ระดับความสูง 200-500 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

