



## เอื้องห่ม

*Coelogyne cumingii* Lindl.

อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จ.สุราษฎร์ธานี ความสูงจากระดับน้ำทะเล 300 - 2,150 เมตร  
ช่วงเวลาในการออกดอก เมษายน - กรกฎาคม

กล้วยไม้อิงอาศัย เหนี่ยวระหว่างลำลูกกล้วยแข็งและเหนียว หนา 0.8-1 เซนติเมตร มีกาบหุ้ม ลำลูกกล้วยรูปไข่ สีเขียวอ่อน ผิวเป็นมัน ขนาด 3.5-4.5x3-4 เซนติเมตร ลำแก้มักมีสันและรอยย่นโดยรอบ ใบ มี 2 ใบ รูปรีแกมรูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบเรียว มีก้านใบสั้นๆ ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบเป็นสีเขียวมันทั้ง 2 ด้าน เส้นใบเห็นได้ชัดเจน ทางด้านบน ใบอ่อนมีกาบซึ่งมีลักษณะเหนียว หุ้มโคนใบไว้ ช่อดอก ตั้งขึ้น เกิดที่ตาข้างใกล้ฐานของลำลูกกล้วย ใน 1 ช่อ มี 2 - 3 ดอก บานพร้อมกัน ดอก สีขาว มีกลิ่นหอม ก้านดอกย่อยสีขาว ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร บิดเล็กน้อยและเป็นร่องตื้นๆ โดยรอบ กลีบเลี้ยงคู่บน รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ปลายแหลม กลีบเลี้ยงคู่ข้าง รูปใบหอก ขนาดเล็กกว่ากลีบเลี้ยงอันบนเล็กน้อย ปลายเรียวแหลม กลีบดอก รูปหอก เล็กกว่ากลีบเลี้ยง ขนาด 3x1 เซนติเมตร ปลายแหลมเรียว ทั้งกลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีสีขาว กลีบปาก ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร แฉกข้างปลายมน ด้านบนเป็นสีขาว ด้านล่างเป็นสีเหลือง เมื่อแผ่ออกทั้ง 2 ข้าง กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร แฉกกลางกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ขอบหยักมน ปลายเป็นติ่งหนามโค้งลง ตรงกลางกลีบปากมีสันหยักมนสีเหลืองเป็นเส้นยาว 3 เส้น ยาว 1.5-2 เซนติเมตร เส้าเกสรสีขาว ผลแห้งแตก รูปไข่กลับพบทั่วไปบนต้นไม้บริเวณที่มีแสงมาก