



เอื้องเหี้ยหน้าเขี้ยว

Coelogyne lentiginosa Lindl.

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาตี จ.นราธิวาส ความสูงจากระดับน้ำทะเล 150 - 1,300 เมตร
ช่วงเวลาในการออกดอก มกราคม - กุมภาพันธ์

กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอกแกมรี มีเหลี่ยมมน ยาวประมาณ 6.5 เซนติเมตร เรียงตัวบนเหง้าห่างกันเล็กน้อย ผิวค่อนข้างมัน สีเขียวอ่อน ใบ ปลายลำมีใบ 2 ใบ รูปรี กว้าง 3-3.5 เซนติเมตร ยาว 8-20 เซนติเมตร แผ่นใบสีเขียวเข้ม หนาและแข็ง โคนเรียวสอบเป็นก้านดอก ช่อดอกเกิดจากยอดใหม่ทางด้านข้างของโคนหัวเก่า ก้านช่อดอกยาว 9-10 เซนติเมตร อวบน้ำ ช่อดอก มี 2-5 ดอก ดอก ขนาดประมาณ 3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองอมเขียว กลีบเลี้ยงใหญ่กว่ากลีบดอก กลีบเลี้ยงกางออก รูปขอบขนานแกมรูปไข่ เป็นร่องตื้น ปลายแหลม กลีบบนกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร กลีบคู่ข้างกว้าง ประมาณ 8 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 3.2 เซนติเมตร โคนกลีบดอกทั้งสองข้างกระดกตั้งขึ้น ขอบกลีบสีน้ำตาล ขอบย้วยเป็นคลื่น ตรงกลางสีเหลืองอมน้ำตาล กลีบปากส่วนปลายแผ่ขนาดใหญ่ มีประและแต้มสีน้ำตาลและเหลือง พบขึ้นตามป่าดิบแล้ง ในพม่า ไทย เวียดนาม