



# เอื้องเทียนตะนาวศรี

ชื่ออื่นๆ :

*Coelogyne tenasserimensis* Seidenf.

ช่วงระยะออกดอก : มีนาคม-สิงหาคม

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ ใบ จำนวน 2 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปใบหอก กว้าง 1.5-5 ซม. ยาว 7.5-30 ซม. ปลายใบแหลม **ช่อดอก** ออกที่ปลายลำลูกกล้วย แบบช่อกระจุก จำนวน 4-6 ดอก โคนมีกาบใบหุ้ม **ดอก** บานเต็มที่กว้าง 2-2.5 ซม. สีเขียวแกมเหลือง **กลีบปาก** สีน้ำตาลแกมเหลือง มีแต้มสีน้ำตาล **กลีบเลี้ยง** รูปใบหอกแกมขอบขนาน **กลีบดอก** รูปแถบ **กลีบปาก** รูปไข่ แยกเป็น 3 พู หูกลีบปากรูปสามเหลี่ยม กลีบปากพุกกลาง รูปไข่กลับ ปลายกลีบมนกลมหรือเว้าบวม ขอบกลีบหยักเป็นคลื่น ตรงกลางกลีบมีสัน 3 สัน สันกลางสั้นมาก สันด้านข้างยาวเกือบจรดปลายกลีบ



**ถิ่นที่อยู่:** พบตามป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใต้ ที่ระดับความสูง 550-850 เมตรจากระดับน้ำทะเล

