



## แห้วหมูป่าปากหยัก

ชื่ออื่นๆ :

*Crepidium octodentatum* (Seidenf.) Szlach

ช่วงระยะออกดอก : เมษายน-มิถุนายนและตุลาคม-พฤศจิกายน

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** กล้ายไม้ดิน ลำต้นตั้งขึ้นมาจากเหง้าสั้นๆ ที่อยู่ใต้ดิน มีใบประมาณ 2-3 ใบ ใบ บาง รูปร่างกว้างๆ ปลายแหลม ฐานเบี้ยว สีเขียว มีรอยพับจีบ ขนาดใบ 5x15 ซม. ออกค่อนข้างชิด หรือซ้อนทับกัน ก้านใบสั้นพัฒนาเป็นกาบหุ้มลำต้น ใบสีม่วงแกมน้ำตาล **ช่อดอก** ออกที่ปลายยอด ยาวประมาณ 12-25 ซม. ก้านช่อดอกสีม่วง ยาวเรียว แกนช่อดอกสั้น ประมาณ 1 ใน 5 ของความยาวช่อดอก **ดอก** ออกหลวมๆ ใบประดับรูปแถบปลายแหลม มักพับลงล่าง ก้านดอกย่อยยาว 1 ซม. ดอกบาน ขนาด 2 ซม. **กลีบปาก** รูปโล่หรือกลม แผ่กว้าง โดดเด่น วางตัวในแนวตั้ง (ปลายกลีบปากอยู่ด้านบน) สีม่วง มีเส้นดอกสีเหลืองออกจากฐานกลีบ วางตัวในแนวรัศมี **กลีบเลี้ยงและกลีบดอก** สีชมพูครีม กลีบปากสีม่วง เส้นเกสรสีเขียว **กลีบเลี้ยงบน** รูปแถบยาวๆ ขอบกลีบด้านบน ข้างม้วนกลับหลัง **กลีบเลี้ยงคู่ล่าง** สั้นกว่าแต่กว้างกว่า สีชมพูเข้ม **กลีบดอก** ขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกับกลีบเลี้ยงบน **กลีบปาก** ยาว 0.8-0.9 ซม. ตรงฐานกลีบปากมีรยางค์ขนาดใหญ่ 2 อัน รูปสามเหลี่ยมยื่นออกไปล้อมรอบส่วนของโคนเส้นเกสร มีความยาวประมาณ 1 ใน 4 ของความยาวกลีบปาก ปลายกลีบปากมีรยางค์รูปสามเหลี่ยม คล้ายซีฟีนฉลาม ยาวไล่เลี่ยกัน 8 ซี



ถิ่นที่อยู่ : พบตามพื้นป่าดิบชื้นระดับต่ำ-สูง