

## แห้วหมูตีเหมี

*Crepidium prasinum* (Ridl.) Szlach.

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จ.สตูล ความสูงจากระดับน้ำทะเล 0 - 200 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก สิงหาคม

กล้วยไม้ดิน เจริญด้านข้าง เหง้าสั้นมาก ทำให้ลำต้นขึ้นชิดติดกัน ลำต้นยาว 5.6-6.1 เซนติเมตร ถูกหุ้มด้วยกาบสีม่วงคล้ำ ปลายกาบเป็นรยางค์แข็ง ใบ บาง รูปไข่ถึงรูปใบหอก เบี้ยว ขนาด 1.5-4.2x2.2-15 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบพับจีบเล็กน้อย ก้านใบพัฒนาเป็นกาบหุ้มลำต้น ใบสีเขียวแต้มด้วยสีม่วงคล้ำ (บางครั้งม่วงทั้งใบ) โดยเฉพาะบริเวณเส้นแขนงใบ ซึ่งมี 5 เส้นตามความยาวใบ มีประมาณ 6 ใบต่อต้น ช่อดอก เกิดที่ปลายยอด ยาว 12-18 เซนติเมตร ก้านช่อดอกสีม่วง ยาว 8-11 เซนติเมตร แกนช่อดอกเป็นสันและเป็นครีบริ้ว ยาว 4.2-9.3 เซนติเมตร ใบประดับรูปสามเหลี่ยม ปลายมน ยาว 4-6 มิลลิเมตร ดอกย่อยมีขนาดเล็ก 3-7 มิลลิเมตร มีจำนวนมาก สีเขียวเรียงตัวเวียนเป็นเกลียวบนแกนช่อดอก ก้านดอกย่อยและรังไข่สีเขียว เป็นสันและครีบริ้วเช่นกัน กลีบเลี้ยงบน รูปขอบขนาน ปลายมน โค้งกลับหลัง ขนาด 3x7 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงคู่ล่าง รูปรีกว้างๆ เว้าโค้ง ปลายมนและโค้งกลับหลัง ขนาด 3.5x6 เซนติเมตร กลีบดอก ขนาดเล็ก รูปแถบ ปลายมน ขอบกลีบม้วนกลับหลัง ขนาด 1x7 มิลลิเมตร กลีบปาก ขนาด 7x9 มิลลิเมตร โค้งมาหน้า มีหูกลิบริ้วรูปไตขนาดใหญ่ มีรยางค์คล้ายเขี้ยวที่ฐานกลีบ ปลายกลีบรูปสามเหลี่ยม ปลายเรียวแหลม เล้าเกสรสั้น 1x2 มิลลิเมตร พบตามพื้นที่ป่าดิบชื้นเขาหินปูน ที่มีดินลึกและมีการสะสมของอินทรีย์วัตถุ