



## แห้วหมูก้นใต้

ชื่ออื่นๆ :

*Crepidium prasinum* (Ridl.) Szlach.

ช่วงระยะออกดอก : สิงหาคม

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** กล้ายไม้ดิน เจริญด้านข้าง เหง้าสั้นมาก ทำให้ลำต้นขึ้นชิดติดกัน ลำต้นยาว 5.6–6.1 ซม. ถูกหุ้มด้วยกาบสีม่วงคล้ำ ปลายกาบเป็นรยางค์แข็ง ใบ บาง รูปไข่ถึงรูปใบหอก เบี้ยว ขนาด 1.5-4.2x6.2-15 ซม. ปลายเรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบพับจีบเล็กน้อย ก้านใบพัฒนาเป็นกาบหุ้มลำต้น ใบสีเขียวแถมด้วยสีม่วงคล้ำ (บางครั้งม่วงทั้งใบ) โดยเฉพาะบริเวณเส้นแขนงใบ ซึ่งมี 5 เส้นตามความยาวใบ มีประมาณ 6 ใบต่อต้น **ช่อดอก** เกิดที่ปลายยอด ยาว 12-18 ซม. ก้านช่อดอกสีม่วง ยาว 8-11 ซม. แกนช่อดอกเป็นสันและเป็นครีบ สีเขียว ยาว 4.2-9.3 ซม. ใบประดับรูปสามเหลี่ยม ปลายมน ยาว 4-6 มม. **ดอก** ย่อยมีขนาดเล็ก 3-7 มม. มีจำนวนมาก สีเขียว เรียงตัวเวียนเป็นเกลียวบนแกนช่อดอก ก้านดอกย่อยและรังไข่สีเขียว เป็นสันและครีบเช่นกัน **กลีบเลี้ยงบน** รูปขอบขนาน ปลายมน โค้งกลับหลัง ขนาด 3x7 มม. **กลีบเลี้ยงคู่ล่าง** รูปรีกว้างๆ เว้าโค้ง ปลายมนและโค้งกลับหลัง ขนาด 3.5x6 ซม. **กลีบดอก** ขนาดเล็ก รูปแถบ ปลายมน ขอบกลีบม้วนกลับหลัง ขนาด 1x7 มม. **กลีบปาก** ขนาด 7x9 มม. โค้งมาหน้า มีหูกลิบริบรูปไตขนาดใหญ่ มีรยางค์คล้ายเขี้ยวที่ฐานกลีบ ปลายกลีบรูปสามเหลี่ยม ปลายเรียวแหลม เส้าเกสรสั้น 1x2 มม.



**ถิ่นที่อยู่ :** พบตามพื้นป่าดิบชื้นเขาหินปูน ที่มีดินลึกและมีการสะสมของอินทรีย์วัตถุ