



เอื้องลำเหียน

Cylindrolobus neglectus (Ridl.) J.J.Wood

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส ความสูงจากระดับน้ำทะเล 0 - 1,400 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก สิงหาคม - ธันวาคม

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางช้าง รากกิ่งอากาศ เหง้าแตกแขนง ต้นโคงตั้งขึ้น กลมเล็กตรงโคน ค่อนข้างแบนกว้างตรงปลาย มีกาบแห้ง สีน้ำตาลเข้มหุ้มตลอดทั้งต้น ใบ รูปรี 2-3 ใบ แผ่นใบบางเรียบ ปลายใบแหลม ดอก ออกที่ยอด ครั้งละ 1 ดอก มีกาบแหลมแห้ง สีน้ำตาลเข้ม ยาว 1.5-2 เซนติเมตร หุ้มหลายกาบ ใบประดับดอกบาง เรียวแหลม สีชมพูอ่อน กลีบเลี้ยงทั้งสามสีชมพูอ่อน โคนกลีบสีชมพูเข้ม กลีบเลี้ยงบนรูปรี กลีบเลี้ยงคู่ข้าง ฐานกว้าง 0.6 เซนติเมตร ยาว 1.2 เซนติเมตร กลีบดอกบาง รูปแถบ สีชมพูอ่อนแกมสีครีม กลีบปาก กว้างและยาว 1 เซนติเมตร หูกลีบปากชี้ไปข้างหน้า ปลายแหลม ขอบด้านในบางและโค้ง ระหว่างหูกลีบปากทั้งสองมีสันนูนสีชมพูแกมน้ำตาลอ่อน 3 สัน พาดจากโคน กลีบปากสิ้นสุดที่ฐานของ ปลายกลีบปาก ปลายกลีบปากสีเหลืองครีม ขอบหยักเป็นริ้ว ตรงกลางมีสันนูน คล้ายหงอนไก่ 1 สัน ฐานเส้าเกสรมีส่วนขยาย นูนออกมาตั้งฉากกับคางเส้าเกสร เส้าเกสรสีชมพูเข้ม ฝักรอบกลุ่มเรณูสีเหลืองครีมตามปามอสส์ บนหินปูนที่มีตะไคร่น้ำหรือบนต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ำและป่าชายเลนสมบูรณ์