



# เอื้องลำเตียน

ชื่ออื่นๆ :

*Cylindrolobus neglectus* (Ridl.) J.J.Wood

ช่วงระยะออกดอก : สิงหาคม-ธันวาคม

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** กล้ายไม้มีอิงอาศัย เจริญทางข้าง รากกิ่งอากาศ เหง้าแตกแขนง ต้นโค้งตั้งขึ้น กลมเล็กตรงโคน ค่อนข้างแบนกว้างตรงปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางตรงโคน 0.3-0.4 ซม. ความกว้างใกล้ยอด 0.9 ซม. หนา 0.5 ซม. ความยาวต้น 15 ซม. มีกาบแห้งสีน้ำตาลเข้มหุ้มตลอดทั้งต้น ยอดมี ใบ รูปรี 2-3 ใบ ใบกว้าง 3.1-3.7 ซม. ยาว 11-13 ซม. แผ่นใบบางเรียบ ปลายใบแหลม ดอก ออกที่ยอด ครั้งละ 1 ดอก มีกาบแหลมแห้ง สีน้ำตาลเข้ม ยาว 1.5-2 ซม. หุ้มหลายกาบ ใบประดับดอกบาง เรียวแหลม สีชมพูอ่อน ยาว 0.8 ซม. ก้านดอกย่อย ยาว 1 ซม. ดอกบานกว้าง 1.9 ซม. **กลีบเลี้ยง** ทั้งสามสีชมพูอ่อน โคนกลีบสีชมพูเข้ม **กลีบเลี้ยงบน** รูปรี กว้าง 0.5 ซม. ยาว 1.3 ซม. **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** ฐานกว้าง 0.6 ซม. ยาว 1.2 ซม. **กลีบดอก** บาง รูปแถบ สีชมพูอ่อนแกมสีครีม กว้าง 0.2 ซม. ยาว 1.1 ซม. **กลีบปาก** กว้างและยาว 1 ซม. หูกลีบปาก ชี้ไปข้างหน้า ปลายแหลม ขอบด้านในบางและโค้ง ระหว่างหูกลีบปากทั้งสองมีสันนูนสีชมพูแกมน้ำตาลอ่อน 3 สัน พาดจากโคน กลีบปากสิ้นสุดที่ฐานของ ปลายกลีบปาก ปลายกลีบปากสีเหลืองครีม ขอบหยักเป็นริ้ว ตรงกลางมีสันนูน คล้ายหอนไก่ 1 สัน ฐานเส้าเกสรมีส่วนขยาย นูนออกมาตั้งฉากกับคางเส้าเกสร เส้าเกสรสีชมพูเข้ม ยาว 0.5 ซม. ฝากรอบกลุ่มเรณูสีเหลืองครีม



**ถิ่นที่อยู่ :** ตามป่ามอสส์ บนหินปูนที่มีตะไคร่น้ำหรือบนต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ำ และป่าชายเลนสมบูรณ์ ที่ความสูงถึง 1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล