



กระแจะร้อห

Cymbidium aloifolium (L.) Sw.

อุทยานแห่งชาติเขาลาวง จ.นครศรีธรรมราช ความสูงจากระดับน้ำทะเล 0 - 1,100 เมตร
ช่วงเวลาในการออกดอก มีนาคม - เมษายน

กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นมีขนาดสั้น เเกาะรวมกันเป็นกระจุกแน่น (ลำต้นเป็นหัวรูปรี มีหลายข้อ และขึ้นชิดกันเป็นกอๆ) ต้นมีรากออกเป็นเส้นแข็ง ซึ่งขึ้นไปในอากาศ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบมนเว้าเล็กน้อย โคนใบสอบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร และยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร แผ่นใบมีลักษณะหนาแข็ง หลังใบและท้องใบเรียบ ข้อดอก เป็นข้อส่ายห้อยลง โดยจะออกที่โคนต้น มีข้อดอกประมาณ 1-2 ข้อ ข้อดอกมีความยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร ในข้อดอกมีดอกย่อยจำนวนมาก (ประมาณ 17-26 ดอก) ดอก มีขนาดประมาณ 2.5 เซนติเมตร (บ้างว่าเส้นผ่านศูนย์กลางดอกกว้างประมาณ 3.5 เซนติเมตร) กลีบดอก สีสีเหลือง มีลักษณะเป็นรูปแถบ มีแถบสีม่วงหรือสีน้ำตาลอมแดงขอบขาว ส่วนกลีบเลี้ยงมี 3 กลีบ มีลักษณะเป็นรูปแถบ โดยกลีบดอกจะแคบและสั้นกว่ากลีบเลี้ยง ดอกมีเกสรเพศผู้มีสีเหลือง ผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก เป็นพู่ 5 พู่ ผิวผลเรียบ (บ้างว่าผลมีลักษณะเป็นรูปขอบขนาน สีน้ำตาล ยาวประมาณ 6-7 เซนติเมตร) ผลเป็นสีเขียวอมสีเหลือง เมื่อผลแห้งจะแตกได้ ใบผลมีเมล็ดเป็นผงละเอียดจำนวนมาก พบได้ตามป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ (บ้างว่าพบได้ตามป่าเต็งรัง) ตามที่ไล่แจ้งมีแสงแดดจัด ในหลายระดับความสูง