



กะเหรเกะร่อน

ชื่ออื่นๆ : เอื้องปากเปิด เอื้องดำข้าว กล้วยทางไหล การการ่อน

Cymbidium aloifolium (L.) Sw.

ช่วงระยะออกดอก : มีนาคม-เมษายน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นมีขนาดสั้น เกาเขรวมกันเป็นกระจุกแน่น (ลำต้นเป็นหัวรูปรี มีหลายข้อ และขึ้นชิดกันเป็นกอๆ) ต้นมีรากออกเป็นเส้นแข็ง ชี้ขึ้นไปในอากาศ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบมนเว้าเล็กน้อย โคนใบสอบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2 ซม. และยาวประมาณ 30-50 ซม. แผ่นใบมีลักษณะหนาแข็ง หลังใบและท้องใบเรียบ **ช่อดอก** เป็นช่อสายห้อยลง โดยจะออกที่โคนต้น มีช่อดอกประมาณ 1-2 ช่อ ช่อดอกมีความยาวประมาณ 30-50 ซม. ในช่อดอกมีดอกย่อยจำนวนมาก (ประมาณ 17-26 ดอก) ดอก มีขนาดประมาณ 2.5 ซม. (บ้างว่าเส้นผ่านศูนย์กลางดอกกว้างประมาณ 3.5 ซม.) **กลีบดอก** สีสีเหลือง มีลักษณะเป็นรูปแถบ มีแถบสีม่วงหรือสีน้ำตาลอมแดงขอบขาว ส่วนกลีบเลี้ยงมี 3 กลีบ มีลักษณะเป็นรูปแถบ โดยกลีบดอกจะแคบและสั้นกว่ากลีบเลี้ยง ดอกมีเกสรเพศผู้มีสีเหลือง ผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก เป็นพู 5 พู ผิวผลเรียบ (บ้างว่าผลมีลักษณะเป็นรูปขอบขนาน สีน้ำตาล ยาวประมาณ 6-7 ซม.) ผลเป็นสีเขียวอมสีเหลือง เมื่อผลแห้งจะแตกได้ ในผลมีเมล็ดเป็นผงละเอียดจำนวนมาก

ถิ่นที่อยู่ : พบได้ตามป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ (บ้างว่าพบได้ตามป่าเต็งรัง) ตามที่โล่งแจ้งมีแสงแดดจัด ในหลายระดับความสูง

