



กะเรกะร้อนตำข้าว

ชื่ออื่นๆ :

Cymbidium bicolor Lindl.

ช่วงระยะออกดอก : เมษายน-มิถุนายน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้ายไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง กอเป็นกระจุก รากกิ่งอากาศ โคนต้นป่องเล็กน้อย ใบ เรียงสลับ ชี้ขึ้น สีเขียวอ่อน รูปขอบขนาน กว้าง 1-1.5 ซม. ยาวไม่เกิน 45 ซม. แผ่นใบเรียบ ค่อนข้างหนา ปลายใบเบี้ยว **ช่อดอก** ออกที่โคนต้น ห้อยลง สีม่วงสด ยาวไม่เกิน 25 ซม. **ดอก** มีกลิ่นหอม กว้าง 3.6 ซม. ขอบสีเหลืองอ่อน ตรงกลางสีม่วงเข้ม **กลีบเลี้ยงบน** ชี้ขึ้น รูปขอบขนานปลายแหลม กว้าง 0.5 ซม. ยาว 2 ซม. **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** กางออก ไม่สมมาตร ขนาดเท่าๆ กลีบเลี้ยงบน **กลีบดอก** รูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 0.5 ซม. ยาว 1.8 ซม. **กลีบปาก** กว้าง 1.2 ซม. ยาว 1.5 ซม. ผนังของกลีบปากด้านในสีเหลืองอ่อน แต้มด้วยจุดสีม่วงแกมน้ำตาล ฐานกลีบปากเว้าลึกลงคล้ายหลุม ปลายกลีบปากฐานสีเหลือง ปลายแหลมสีม่วงเข้ม โค้งลงเกือบม้วน เส้นเกสรโค้ง สีม่วง ขอบยอดเกสรเพศเมีย สีม่วงเข้ม ฝากรอบกลุ่มอัณฑะสีเหลืองถึงเหลืองเข้ม แต้มด้วยสีม่วงจางๆ



ถิ่นที่อยู่ : พบในป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ทั้งที่โล่งแจ้งและแสงแดดรำไร ที่หลายระดับความสูง บางครั้งพบบนต้นตาลตามท้องนา