



กระร่อนหัดใบหอก

Cymbidium lancifolium Hook.

อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จ.สุราษฎร์ธานี ความสูงจากระดับน้ำทะเล 0 - 1,500 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก พฤษภาคม

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางช้าง รากกิ่งอากาศ กอแน่น ต้นเป็นเหง้าทอดยาว แตกแขนง ใบจำนวนมาก ใบ เรียงสลับ รูปขอบขนาน ปลายใบมน เว้าบุม เบี้ยว แผ่นใบหนา ค่อนข้างเรียบ กลางใบเป็นร่องตลอดความยาว ใบกว้างได้ถึง 4 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 1 เมตร ช่อดอก ออกที่โคนต้น ยาวได้ถึง 1 เมตร ห้อยลง โคนช่อมีใบประดับซ้อนกันหลายใบ ดอก สีเหลืองแกมน้ำตาล มีกลิ่นหอม กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 4.6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง รูปขอบขนาน ปลายมนหรือแหลม กว้าง 0.8-0.9 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร กลางกลีบมีแถบสีม่วงเข้ม กลีบดอก ไม่สมมาตร ปลายแหลม กว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร ชี้นอนไปข้างหน้าอยู่ชิดติดกับกลีบเลี้ยงบน กลีบปาก ยาว 2.6 เซนติเมตร ชี้นอนไปข้างหน้า กลีบปากช่วงล่าง ขอบห่อตัวโค้งขึ้นด้านนอกสีม่วงเข้ม ด้านในมีแถบสีม่วงจางและเข้มสลับกัน กลางกลีบมีสันนูน 2 สัน สีม่วงแดง ปลายสันสีเหลือง หูกลีบปากแหลม ชี้นอนไปข้างหน้า ปลายกลีบปากรูปรี ม้วนลงเส้าเกสรโค้ง สีเหลืองแกมน้ำตาล แด้มด้วยจุดประสีม่วง ยาว 1.8 เซนติเมตร พบในป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น