



## กะเรกะร่อนตีนตันตั้ง

ชื่ออื่นๆ :

*Cymbidium caulescens* Ridl.

ช่วงระยะออกดอก : สิงหาคม-ตุลาคม

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** กล้ายไม้ดิน เจริญทางข้าง รากเกิดที่โคนต้น ใหญ่ หนา และยาว มีลำต้นรูปทรงกระบอก ยาว 6-7 ซม. มีกาบใบ รูปใบหอก ยาวประมาณ 2 ซม. ปลายแหลม หุ้มซ้อนทับกัน เรียงสลับในระนาบเดียว มีใบติดอยู่ 2-3 ใบ ที่ส่วนปลายลำต้น ใบ รูปใบหอก ขนาด 0.6-1x3.5 ซม. ปลายแหลม ลักษณะคล้ายแผ่นหนัง บางๆ โค้งกลับ ฐานสอบเรียว **ช่อดอก** แบบกระจะ ออกที่ซอกใบใกล้ยอด ยาว 12-14 ซม. ก้านช่อยาวเรียว เกือบไม่มีกาบหุ้ม **ดอก** ย่อย 5-8 ดอก ออกหลวมๆ ใบประดับรูปใบหอก ยาวประมาณ 1 ซม. ปลายเรียวแหลม ก้านดอกเรียว ยาวประมาณ 1.5 ซม. **กลีบเลี้ยง** สีเหลืองครีม รูปใบหอกแกมรูปเคียว ปลายเรียวแหลม **กลีบดอก** มีลักษณะคล้ายกัน ขนาด 0.3x1.5 ซม. สีเหลืองครีม มีเส้นลายดอกสีม่วงแดงที่กลางกลีบ มักโค้งและชี้มาข้างหน้า **กลีบปาก** สั้นกว่า สีเหลืองครีม มีจุดสีม่วงแดงแต้ม แผ่นกลีบปากมี 3 พู พูที่เป็นหูกกลีบสั้น ยกตัวตั้งขึ้น ปลายกลมมน พูปลายกลีบ รูปใบหอก ปลายแหลมถึงติ่งแหลม มักโค้งงอลงล่าง มีสันบางๆ กลางกลีบปาก 2 สัน พาดตามยาว ยกตัวขึ้น เอียงเข้าหากันคล้ายอุโมงค์ จากโคนกลีบถึงกลางกลีบ เส้าเกสร ยาว 0.7 ซม. โค้งคล้ายคันศรมาหน้า ฝาปิดอับเรณูสีเหลืองสด ด้านข้างเส้าแผ่เป็นครึ่ง



**ถิ่นที่อยู่ :** พบตามพื้นที่ป่าที่มีการสะสมอินทรีย์วัตถุ ภายใต้ร่มเงา ในป่าดิบชื้นที่ราบต่ำ