



เอื้องเทียนขน

ชื่ออื่นๆ :

Coelogyne tomentosa Lindl.

ช่วงระยะออกดอก : มิถุนายน-สิงหาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง กอแน่น รากฝอย เหง้าสั้น ลำลูกกล้วย ทรงกรวย ส่วนโคนเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.3 ซม. ยาว 13 ซม. เมื่่อ่อนสีเขียวมีสัน 2 สัน ตรงข้ามกัน เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเขียวมเหลือง ยับย่นเกิดสันหลายสัน ปลายลำลูกกล้วยมี ใบ รูปไข่กลับขนาดใหญ่ 2 ใบ สีเขียวอ่อน ก้านใบยาว 7 ซม. ใบกว้าง 10 ซม. ยาว 30 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียว **ช่อดอก** เกิดที่โคนลำลูกกล้วยห้อยลง ยาว 40-50 ซม. สีเขียวอ่อน โคนช่อดอกมีกาบรูปรีแกมรูปไข่ สีครีมซ้อนเหลื่อมกัน 6 กาบ ดอกในช่อมีได้ถึง 20 ดอก ระยะห่างกันสม่ำเสมอดูสวยงาม ใบประดับดอกรูปรี ติดทน ห่อหุ้มก้านดอกย่อยสีครีม กว้าง 1.5 ซม. ยาว 1.8 ซม. ก้านดอกย่อยรวมทั้งรังไข่สีน้ำตาลอ่อน ยาว 3 ซม. ดอกบานกว้าง 3.4 ซม. **กลีบเลี้ยงบน** รูปรีแกมขอบขนาน สีเหลืองแกมน้ำตาลอ่อน ปลายเรียวแหลม กลางกลีบเป็นร่อง กลีบกว้าง 0.8 ซม. ยาว 2.3 ซม. **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** กว้างน้อยกว่า ความยาวใกล้เคียงกัน **กลีบดอก** สีเหลืองอ่อน รูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลม โคนสอบเรียว กว้าง 0.4 ซม. ยาว 2.1 ซม. **กลีบปาก** สีขาว กว้าง 1.4 ซม. ยาว 2 ซม. หูกลีบปากขอบสีขาว ผนังด้านในสีน้ำตาล พาดด้วยเส้นสีขาว กลางกลีบปากมีสัน 3 สัน พาดตลอดความยาวของกลีบปาก สันดังกล่าวสีขาว ปลายสันหยักคล้ายซี่ฟันสีน้ำตาล ที่ปลายกลีบปากมีสันเพิ่มขึ้นไปอีก 2 สัน ทั้ง 5 สัน สันกลางสิ้นสุดก่อนถึงปลายกลีบปาก ปลายกลีบปากเรียวแหลมงอนลงขอบหยักเป็นริ้วสีขาว ตรงกลางตรงบริเวณที่เป็นจุดสิ้นสุดของสัน ผนังกลีบสีเหลืองอ่อน เส้นเกสรสีขาว ฝากรอบกลุ่มอัษฎางศ์



ถิ่นที่อยู่ : บนต้นไม้ตามริมน้ำหุบเขาระดับสูง สันเขาสูงในป่าดิบเขาระดับ 1,000 เมตรขึ้นไป

