



หวดพ้อว

ชื่ออื่นๆ :

Callostylis pulchella (Lindl.) S.C.Chen & Z.H.Tsi

ช่วงระยะออกดอก : พฤษภาคม-กรกฎาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง กอโปร่ง รากยาว เหนียว ต้นเป็นเหง้าแข็ง เหนียว เลื้อยทอดยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 ซม. ปล้องยาว 1.5-2.5 ซม. ลำลูกกล้วยอยู่ห่างกัน 6-14 ซม. ลำลูกกล้วย รูปรีแบน โคนเป็นก้านมีกาบหุ้มเมื่อแก่ขยับย่น สีเขียวออกเหลือง หนา 0.8-1.4 ซม. กว้าง 1.6-2 ซม. ความยาวรวมทั้งก้าน 7-10 ซม. บริเวณยอดมีใบ 2-3 ใบ รูปรีปลายใบแหลม เว้าบวม กว้าง 3-4 ซม. ยาว 8-14 ซม. แผ่นใบบางเรียบ **ช่อดอก** แบบช่อกระจุก ออกที่ยอดลำลูกกล้วย ยาวประมาณ 6.5-7 ซม. ก้านช่อดอกกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม. ใบประดับดอกอวบน้ำ รูปครึ่งวงกลม กว้าง 0.4 ซม. ก้านดอกย่อย ยาว 1.8 ซม. ก้านช่อดอก ใบประดับดอก ก้านดอกย่อย กลีบดอก ทั้งด้านนอกและด้านในมีขนปุยสีขาวปกคลุม **ดอก** บานกว้างและยาว 2.3 ซม. **กลีบเลี้ยงบน** รูปรี กว้าง 0.5-0.6 ซม. ยาว 1.4-1.5 ซม. **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** ลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับกลีบเลี้ยงบน กลีบดอกเล็กกว่าเล็กน้อย ทั้งกลีบดอกและกลีบเลี้ยง แรกบานสีเหลือง ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มอมเหลืองอ่อนๆ และพับขึ้นไปด้านหลังฐานกลีบปากซึ่งเป็นส่วนของคางยื่นตัวเล็กน้อย มีกลุ่มเนื้อเยื่อสีน้ำตาลเข้ม **กลีบปาก** เคลื่อนไหวได้รูปครึ่งวงกลม อวบน้ำ กว้างและยาว 0.6 ซม. ปลายกลีบปากมีกลุ่มขนสีเหลืองมองดูคล้ายเป็นติ่ง ขอบทั้งสองข้างพับลง สีเหลืองออกเขียวอ่อน ปกคลุมด้วยขนสั้นๆ สีเหลือง ฐานกลีบปากมีเส้นสีน้ำตาล 3 เส้น พาดและรวมเป็นเส้นเดียวบริเวณกลางกลีบปาก เส้นแวงโค้งตัวไปข้างหน้ายาว 0.7 ซม.



ถิ่นที่อยู่ : ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ และป่าดิบชื้นที่ความสูงถึง 1,000 เมตร