



เอื้องสายแดง

ชื่ออื่นๆ :

Dendrobium sanguinolentum Lindl.

ช่วงระยะออกดอก : กันยายน-ตุลาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง ลำลูกกล้วยสีม่วง ผอม คดไปมา ยาว 60 ซม. หรือมากกว่า แก่เกิดร่อง
ใบ รูปรีเรียงตัวแบบสลับ ปลายแหลม กว้าง 2.5 ซม. ยาว 7 ซม. โคนเป็นกาบมีแถบสีม่วงพาดตามยาว หุ้มตลอดความยาวปล้อง
ช่อดอก ออกบริเวณข้อปลายลำลูกกล้วยที่ทิ้งใบจนหมด ในแต่ละช่อจะมีดอก 2 - 6 ดอก อยู่ชิดติดกันเป็นกลุ่ม ช่อดอกสั้นมาก สีม่วง
ก้านดอกย่อยยาว 2.5 ซม. สีขาวครีม โกล้ฐานดอกมีสีม่วง **กลีบเลี้ยงบน** รูปรีปลายแหลมมน กว้าง 0.9 ซม. ยาว 1.9 ซม.
กลีบเลี้ยงคู่ข้าง รูปรีปลายแหลม กว้างและยาวกว่ากลีบเลี้ยงบนเล็กน้อย **กลีบดอก** บาง รูปไข่กลับแกมรูปช้อน กว้าง 1.2 ซม. ยาว
1.4 ซม. หลังกลีบอาจมีหรือไม่มีแถบสีม่วงพาดตามยาว ทั้งกลีบดอกและกลีบเลี้ยงสีเหลืองครีม **กลีบปาก** รูปไข่กลับ ยาว 3 ซม.
ฐานของกลีบปากส่วนโคน สีออกขาว มีส่วนพิเศษเป็นติ่งแหลมคล้ายหนามสีเหลือง ยาว 0.5 ซม. หูกลีบปากตั้งขึ้นปลายโค้งเข้า
ฐานกว้าง 1 ซม. สูง 0.5 ซม. ระหว่างหูกลีบปากทั้งสองข้าง มีจุดแต้มสีส้มรูปสี่เหลี่ยม กว้างและยาว 0.5 ซม. เห็นชัดเจน ปลาย
กลีบปากสีเหลืองครีม รูปครึ่งวงกลม ขอบบางหยักเป็นริ้ว ตรงกลางเว้าบุ๋ม ฐานเส้าเกสรเป็นคางชี้เอนไปทางด้านหลัง ปลายคาง
ด้านนอกสีม่วง คางยาว 1 ซม. เส้าเกสรยื่นตัวเล็กน้อย ผนังเส้าเกสรทางด้านในเป็นสัน 2 สัน ตรงกลางเป็นร่อง 2 สันดังกล่าว
มีสีม่วงแต้ม ฝาครอบกลุ่มอับเรณูสีขาว มีเนื้อเยื่อคล้ายขนละเอียดสีม่วงจางๆ แยกเป็น 2 กลุ่ม มองดูคล้ายตาตุ๊กแตน



ถิ่นที่อยู่ : พบในป่าที่ราบลุ่มและบนเนินเขาตามต้นไม้ ที่ความสูง 600-900 เมตร จากระดับน้ำทะเล