



เอื้องขาไก่ปากพวย

ชื่ออื่นๆ :

Dendrobium comatum (Blume) Lindl.

ช่วงระยะออกดอก : มีนาคม-เมษายน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญด้านข้าง มีเหง้าทอดเลื้อย ที่สามารถเจริญเป็นลำต้นที่ไม่มีรากและแตกกิ่งได้หลายกิ่ง สีเหลือง แต่ละปลายปล้องของกิ่งพัฒนาเป็นลำลูกกล้วย และแตกกิ่งใหม่ตรงฐานของลำลูกกล้วย มี 1 ใบ ต่อลำลูกกล้วย ใบหนา แข็ง รูปรี แผ่กว้าง ปลายแหลม ฐานใบแหลม มักบิดพริ้ว ขนาด 5x10 มม. ดอก ออกจากซอกใบส่วนปลายลำลูกกล้วย มี 1-2 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ซม. สีเหลืองซีด มีจุดประสีม่วงซีดแต้ม โคนก้านดอกมีกลุ่มของใบประดับเป็นเกล็ดต่างๆ คางดอกค่อนข้างยาว กลีบปาก เป็น 3 พู หูกลีบค่อนข้างใหญ่ เป็นรูปสี่เหลี่ยม ตั้งขึ้น ปลายกลีบปากรูปขอบขนาน ยื่นยาวไปด้านหน้า ขอบกลีบบิดเป็นคลื่น ส่วนปลายสุดมีรยางค์ คล้ายหนวด หลายเส้น ยื่นยาวไม่เป็นระเบียบ กลีบปากตามความยาวจะมีแผ่นเนื้อเยื่อ 2 รั้ว พาดยาวมาจากโคนกลีบ ยกตัวเป็นสันโค้งในช่วงแรก และพับม้วนเป็นคลื่นในช่วงปลายสัน



ถิ่นที่อยู่ : พบตามต้นไม้หรือบนหิน ในป่าดิบที่ราบต่ำ