



เอื้องขาไก่แจ้

ชื่ออื่นๆ :

Dendrobium angustifolium (Blume) Lindl. subsp. *angustifolium*

ช่วงระยะออกดอก : กรกฎาคม-สิงหาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง ต้นเป็นเหง้า สีเขียวออกเหลือง ทอดตัวยาวและแตกแขนง ลำลูกกล้วยทรงกระสวย สีเขียวออกเหลือง แต่ละลำลูกกล้วยจะมี **ใบ** เพียง 1 ใบ รูปไข่แกมรูปหอก บางแต่เหนียว ปลายใบเว้าบวม ดอกเกิดที่ยอดลำลูกกล้วยบริเวณหลังใบ ตาดอกปกคลุมด้วยใบประดับ เป็นกาบแห้งสีออกส้ม **ดอก** จะเป็นดอกเดี่ยว ก้านดอกย่อยยาว 1.1 ซม. โกลีฐานดอกเป็นแถบสีม่วง ดอกกว้าง 1.4 ซม. ยาว 0.6 ซม. **กลีบเลี้ยงและกลีบดอก** สีเหลืองอ่อน มีเส้นสีน้ำตาลม่วง พาดโดยตลอด **กลีบเลี้ยงบน** รูปรี **กลีบปาก** ช่วงโคนสีม่วง หูกลีบปาก ขอบสีขาว กลางกลีบปากมีสัน 3 สัน สองสันข้างสีม่วงเข้ม บริเวณกลีบปาก ส่วนโคนสองสันนี้จะพองตัวหนาแผ่ออก แล้วรวบเข้าเกือบติดกับสันกลาง ที่ฐานปลายกลีบปาก ส่วนสันกลางสีออกขาว หนูนเล็กน้อย กลางปลาย กลีบปากเว้าหยักเข้าจนแบ่งปลายกลีบปากออกเป็นรูปกลม 2 รูป ปลาย กลีบปากนี้มีสีส้มเข้ม 2-3 ชั่วโมง ถัดมาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มอมม่วง คางยาว 0.5 ซม. เส้าเกสรสีเขียวอ่อน ไม้ยืนตัว ฝากรอบเส้าเกสร สีเขียวอ่อน ครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง

ถิ่นที่อยู่ : พบในประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย ชวา และสุมาตรา ในป่าดิบชื้นบนลำต้นของต้นไม้ ที่ระดับความสูงประมาณ 800-1,000 เมตร

