



ว่านหน้าทอง

Ludisia discolor (Ker Gawl.) Blume

อุทยานแห่งชาติไทรบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ความสูงจากระดับน้ำทะเล 70 - 1,100 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก กรกฎาคม - สิงหาคม

กล้วยไม้ขึ้นบนหิน เหง้าทอดเลื้อย ลำต้นอวบมีน้ำ มีรากตามข้อ มี 3-7 ใบ ออกเป็นกระจุกที่โคนต้น ลำต้นยาวได้ถึง 3.4 เซนติเมตร ใบรูปไข่ถึงรูปขอบขนาน ยาว 0.8-8.5 เซนติเมตร แผ่นใบหนา ด้านบนสีเขียวเข้ม มีสีขาวและสีน้ำตาลแดงแซม ด้านล่าง มีสีม่วงแซม ปลายแหลมมนหรือเป็นติ่งแหลม ช่อดอก คล้ายช่อเชิงลด ออกที่ปลายยอด ตั้งตรง สูง 9-28 เซนติเมตร แกนช่อยาว 1-9 เซนติเมตร ดอก เรียงห่างๆ มีขนสั้นนุ่ม ใบประดับคล้ายท้องเรือ ยาว 0.7-1.5 เซนติเมตร มีเส้นตามยาว 1 เส้น มี 2-18 ดอก สีขาว ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ ปลายมน ยาว 0.7-1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงข้าง รูปรี เบี้ยว ยาว 0.9-1.2 เซนติเมตร กลีบดอก รูปเคียว ปลายมน ยาว 0.8-1.1 เซนติเมตร กลีบปาก กลางกลีบเป็นร่อง ปลายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ประมาณ 3 มิลลิเมตร เส้าเกสรบิดเวียน ยาว 4-7 มิลลิเมตร อับเรณูสี่เหลี่ยม ยาว 4-4.5 มิลลิเมตร ก้านดอก รวมรังไข่ ยาว 0.8-1.6 เซนติเมตร ฝักรูปกระสวย มีขนสั้นนุ่ม ยาว 1.2-1.6 เซนติเมตร พบที่พม่า จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกระจายทั่วไปทางภาคใต้ พบขึ้นตามโขดหินริมลำธารในป่าดิบชื้น