



แผลงปอทอง

Micropera pallida (Roxb.) Lindl.

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุโขทัย จ.นราธิวาส ความสูงจากระดับน้ำทะเล 0 - 1,000 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก มีนาคม - พฤษภาคม

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ลำต้นเรียว อาจตั้งขึ้นหรือโค้งห้อยลง ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 0.7-1 เซนติเมตร ยาว 5-9 เซนติเมตร เรียงสลับ ปลายใบเว้าบวม กาบใบและโคนใบมีขนละเอียดประปราย ใบโค้งมีรอยคอดกั้ดจากปลายใบลงมา ประมาณ 1 เซนติเมตร ช่อดอก เกิดที่ข้อค่อนไปทางยอด ยาว 2-8 เซนติเมตร ดอกในช่อชิดกัน ทยอยบานสู่ปลายช่อ มีกลิ่นหอม อ่อนๆ ดอก กว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 1.5 เซนติเมตร กลางกลีบเลี้ยงด้านนอกพาดด้วยแถบสีม่วง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวครีม ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลือง กลีบเลี้ยงบน รูปไข่กลับ กว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 0.6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงคู่ข้าง รูปไข่กลับไม่สมมาตร ปลายแหลม กว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 0.4 เซนติเมตร กลางกลีบด้านนอกพาดด้วยแถบสีม่วงจางๆ กลีบปากสีขาว ยาว 0.75 เซนติเมตร หูกลีบปากขนาดใหญ่ ระหว่างหูกลีบปากมีกลุ่มเนื้อเยื่อหนืดเหลือง เส้าเกสรสั้น จะงอยคล้ายปากนก แผลมโค้งงอ พบได้ทั่วไปในป่าดิบ ที่โล่งแจ้งจนถึงแสงแดดรำไร