



ผีเสื้อทอง

Pennilabium struthio Carr

อุทยานแห่งชาติเขานัน จ.นครศรีธรรมราช ความสูงจากระดับน้ำทะเล 0 - 500 เมตร
ช่วงเวลาในการออกดอก มิถุนายน - สิงหาคม

กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นสั้นมาก ใบ รูปรี ขนาด 2.5x10 เซนติเมตร มี 3-4 ใบ แผ่นใบเกลี้ยง ก้านช่อดอกยาว 2-3 เซนติเมตร แต่ละช่อมีดอกที่ปลายช่อ ดอกน้อย ทยอยบานทีละดอก ก้านดอกยาว 1.5 เซนติเมตร ดอก สีเหลือง ขนาด 1.2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง รูปไข่แกมรูปรีจุ่ม ที่ปลายมีสัน กลีบดอกรูปไข่กลับ สั้นกว่ากลีบเลี้ยงเล็กน้อย ขอบกลีบหยักและมีจุดสีน้ำตาลแดง กลีบปาก สั้น มีทุกกลีบขนาดใหญ่รูปพัด ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร สีขาว และปลายหยักเป็นครุย เดี่ยวดอกสีเหลืองครีม ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ปลายเดี่ยวไปพองประมาณครึ่งหนึ่งของความยาว เส้าเกสรสั้น ไม่มีคาง พบในป่าดิบชื้นระดับต่ำ มักพบใกล้ลำธาร บนไม้พุ่มเตี้ยแสงแดดน้อย