พีเสื้อทอง

ชื่ออื่นๆ : เอื้องเข็มทอง

Pennilabium struthio Carr

ช่วงระยะออกดอก : มิถุนายน–สิงหาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นสั้นมาก **ใบ** รูปรี ขนาด 2.5x10 ซม. มี 3-4 ใบ แผ่นใบเกลี้ยง ก้านช่อดอกยาว 2-3 ซม. แต่ละช่อมีดอกที่ปลายช่อ ดอกน้อย ทยอยบานทีละดอก ก้านดอกยาว 1.5 ซม. **ดอก** สีเหลือง ขนาด 1.2 ซม. **กลีบเลี้ยง** รูปไข่แกมรูปรีงุ้ม ที่ปลายมีสัน กลีบดอกรูปไข่กลับ สั้นกว่ากลีบเลี้ยงเล็กน้อย ขอบกลีบหยักและมีจุดสีน้ำตาลแดง **กลีบปาก** สั้น มีหูกลีบขนาดใหญ่รูปพัด ยาวประมาณ 0.6 ซม. สีขาวและปลายหยักเป็นครุย เดือยดอกสีเหลืองครีม ยาวประมาณ 1 ซม. ปลายเดือยโป่งพองประมาณครึ่งหนึ่งของความยาว เส้าเกสรสั้น ไม่มีคาง

ถิ่นที่อยู่ : พบในป่าดิบชื้นระดับต่ำ มักพบใกล้ลำธาร บนไม้พุ่มเตี้ยแสงแดดน้อย

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.dnp.go.th/thailand-wen/issues_tw/pdf_issues/orchid_west.pdf
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี