



เอื้องลำต่อ

ชื่ออื่นๆ :

Pholidota articulata (Lindl.)

ช่วงระยะออกดอก : มีนาคม-สิงหาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง รากกิ่งอากาศ ต้นยาวห้อยลง ลำลูกกล้วยทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6–1 ซม. ยาว 10–16 ซม. ลำลูกกล้วยใหม่งอกทางด้านข้างติดกับยอดของลำลูกกล้วยเดิม ใบ รูปรี 2 ใบ กว้าง 2.7–4.6 ซม. ยาว 14–20 ซม. ปลายใบแหลม แผ่นใบบางเป็นมัน ขอบใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย **ช่อดอก** ผอมห้อยลง ยาว 15 ซม. หรือมากกว่า ออกที่ยอดบนสุดที่ลำลูกกล้วยใหม่ยังเจริญไม่ไผ่ล่พ้น กาบหุ้ม และอาจมีใบเพิ่มขึ้นมา 1–2 ใบ ใบประดับดอกสีนวล บาง รูปรี ปลายแหลม กว้าง 1.1 ซม. ยาว 2 ซม. **ดอก** สีชมพูอ่อนถึงน้ำตาลอ่อน ขนาด 0.8 ซม. **กลีบเลี้ยง** รูปไข่ บางแต่แข็ง กว้าง 0.45 ซม. ยาว 0.8–0.9 ซม. **กลีบดอก** รูปรีแกมขอบขนาน ปลายแหลม ขอบเป็นคลื่น กว้าง 0.3 ซม. ยาว 0.8 ซม. **กลีบปาก** ช่วงโคน ยาว 0.5 ซม. ขอบโค้ง ปลายรวมเข้าหากัน ภาควัดขวางเป็นรูปครึ่งวงกลม ฐานและสันเกือบเป็นสี่เหลี่ยม กลีบปากสีครีมถึงเหลืองเข้ม เส้นตรง สีเหลืองแกมเขียวอ่อน ยอดเกสรเพศเมียมีขอบยื่นตัวออกมา



ถิ่นที่อยู่ : พบได้ทั่วทุกภาค ทั้งบนหินและบนต้นไม้

