



เอื้องลำต๋อถิ่นใต้

ชื่ออื่นๆ :

Pholidota carnea (Blume) Lindl.

ช่วงระยะออกดอก : มีนาคม-พฤษภาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้ายไม้อิงอาศัย เจริญด้านข้าง เหง้าทอดเลื้อย หุ้มด้วยเกล็ดที่ติดทนนาน ลำลูกกล้ายรูปไข่ ขนาด 0.6-1.2 x 1.5-2.5 ซม. ออกที่ปลายเหง้า มีกาบหยาบๆ หุ้มที่ฐาน ลำต้นตั้งขึ้น มีใบ 2 ใบเกิดที่ปลายลำ ใบ รูปเส้นตรงถึงขอบขนานแกมเส้นตรง ขนาด 0.5-1.5x5-18 ซม. ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนใบสอบเรียว ถึงเป็นรูปลิ้ม แผ่นใบเขียวเป็นมัน คล้ายแผ่นหนัง ก้านใบยาว 1.5 ซม. **ช่อดอก** เกลี้ยง ออกจากเหง้าใหม่ที่ไม่เจริญเป็นลำลูกกล้าย ยาวประมาณ 18 ซม. ก้านช่อดอก 1-4.5 ซม. ทำให้แกนกลางช่อดอกเรียวยาว ชิกแซก ดอกออกหลวมๆ 12-25 ดอก มีกาบหุ้มที่โคนก้านช่อนๆ กัน ใบประดับรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ขนาด 2-3.5x 3.5-6 มม. ปลายแหลมหรือหู่ หลุดร่วงง่าย **ดอก** สีขาวอมเขียวหรือม่วงจางๆ ก้านดอกย่อยและรังไข่ ยาว 1.5-3 มม. **กลีบเลี้ยงบน** รูปไข่ ขนาด 1-2x1.6-2.5 มม. ปลายแหลมหรือหู่ **กลีบเลี้ยงคู่ล่าง** รูปไข่กว้าง เบี้ยว ขนาด 1-2.2x1.8-3 มม. ปลายแหลม **กลีบดอก** รูปไข่ ขนาด 1-2x1-2.2 มม. ปลายแหลมหรือหู่ **กลีบปาก** แยกเป็น 3 พู แต่ไม่ชัดเจนนัก ยาว 1.8-2.8 มม. ม้วนเป็นถุงที่ฐานกลีบ ปลายกลีบปากรูปโล่กลมแกมไข่ ปลายแหลมหรือหู่ โค้งลง ประดับด้วยสันเนื้อเยื่อจางๆ 2 สันจากฐานกลีบ หูกลีบ รูปสามเหลี่ยม ปลายกลมมน เส้นแวงสีส้ม ยาว 1-2.5 มม. มีครีบด้านข้าง รูปทรงเรียว ฝักรูปทรงรี ขนาด 0.2-0.4x0.4-0.6 ซม.



ถิ่นที่อยู่ : พบตามต้นไม้ ในป่าดิบเขาในระดับต่ำ-สูง ตั้งแต่ 1,000 เมตร

