



เอื้องเหลิ้มลำเต๋อ

ชื่ออื่นๆ : เอื้องต่อลำเหลิ้ม

Pholidota recurva Lindl.

ช่วงระยะออกดอก : สิงหาคม-ธันวาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง รากยาว เหนียวออกที่ข้อ ต้นเป็นปล้อง เจริญต่อกัน ปล้องอ่อนมีกาบหุ้ม อวบน้ำ มีเหลิ้มเป็นสัน 4 สัน ใบ รูปรี เกิดที่ข้อ ปลายใบแหลม กว้าง 1.8 ซม. ยาว 8 ซม. แผ่นใบบางเป็นมัน **ช่อดอก** เกิดที่ยอด โคนห้อยลง ยาว 10 ซม. ก้านช่อดอกสีเขียว ใบประดับดอกสีน้ำตาลอ่อน รูปรีเกือบกลม กว้าง 0.6 ซม. ยาว 0.7 ซม. เรียงซ้อนเหลื่อมกันตลอดช่อ ดอกบานมีกลิ่นหอม เรียงตัวแน่นด้านเดียวตลอดช่อ **ดอก** กว้าง 0.5 ซม. สีเขียวอ่อนอมน้ำตาล **กลีบเลี้ยงบน** รูปไข่กลับ ตัวกลีบงุ้ม กว้าง 0.25 ซม. ยาว 0.4 ซม. **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** รูปรี ตัวกลีบงุ้ม กว้าง 0.25 ซม. ยาว 0.35 ซม. **กลีบดอก** รูปขอบขนานขนาดเล็ก กว้าง 0.1 ซม. ยาว 0.2 ซม. **กลีบปาก** ขนาดใหญ่รูปเกือบกลม กว้างและยาว 0.4 ซม. ตรงกลางมีสันสั้นๆ 4 สัน ส่วนปลายหยักมน 2 หยัก เส้นกลางโค้ง สัน ฝาครอบกลุ่มอับเรณูบางใส



ถิ่นที่อยู่ : พบในป่าดิบระดับสูง หรือป่าบนเขาหินปูน บริเวณที่โล่งแจ้ง จนถึงแสงรำไร