

เอื้องกระพาะปลา

Pinalia acervata (Lindl.) Kuntze

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่

ความสูงจากระดับน้ำทะเล 100 - 3,000 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก กันยายน - พฤศจิกายน

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญด้านข้าง ลำลูกกล้วยรูปรี หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน แบน มีหลายข้อปล้อง กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 2-5 เซนติเมตร ขึ้นชิดติดกันเป็นกอ ใบออกปลายลำ มี 2-4 ใบ ใบ รูปหอกแกมขอบขนาน ปลายใบแหลม กว้าง 4-10 เซนติเมตร ยาว 8-20 เซนติเมตร ดอก ออกเป็นช่อบริเวณปลายยอด ช่อยาว 3-6 เซนติเมตร มี 4-7 ดอก ขนาดบานกว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีขาว รูปรีแกมขอบขนาน ตอนปลาย เรียวแหลม ปลายกลีบสีเขียวยอมเหลือง กลีบปาก สีเหลืองอ่อน มีสันนูนตามยาว 3 สัน เส้าเกสรสั้น มีคางยื่นยาว ปลายคางสีเหลืองอ่อน ฝากรอบเกสรมีแต้มสีน้ำตาลเข้ม กลุ่มเรณูมี 8 กลุ่ม ไม่มีก้านและแป้นก้านกลุ่มเรณู พบในป่าดิบชื้น และป่าดิบชื้นบนเขาหินปูน บางครั้งพบบน โขดหินชื้น