

เอื้องกระเพาปลา

ชื่ออื่นๆ :

Pinalia acervata (Lindl.) Kuntze

ช่วงระยะออกดอก : กันยายน-พฤศจิกายน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญด้านข้าง ลำลูกกล้วยรูปรี หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนานแบน มีหลายข้อปล้อง กว้าง 1-2 ซม. ยาว 2-5 ซม. ขึ้นชิดติดกันเป็นกอ ใบออกปลายลำ มี 2-4 ใบ ใบ รูปหอกแกมขอบขนาน ปลายใบแหลม กว้าง 4-10 ซม. ยาว 8-20 ซม. ดอก ออกเป็นช่อบริเวณปลายยอด ช่อยาว 3-6 ซม. มี 4-7 ดอก ขนาดบานกว้างประมาณ 1.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีขาว รูปรีแกมขอบขนาน ตอนปลาย เรียวแหลม ปลายกลีบสีเขียวอมเหลือง กลีบปาก สีเหลืองอ่อน มีสันนูนตามยาว 3 สัน เส้นเกสรสั้น มีคางยื่นยาว ปลายคางสีเหลืองอ่อน ฝากรอบเกสรมีแต้มสีน้ำตาลเข้ม กลุ่มเรณูมี 8 กลุ่ม ไม่มีก้านและแป้นก้านกลุ่มเรณู

ถิ่นที่อยู่ : พบในป่าดิบชื้น และป่าดิบชื้นบนเขาหินปูน บางครั้งพบบนโขดหินชื้น