



รองเท้านารี कांगกบ

Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา จ.ระนอง ความสูงจากระดับน้ำทะเล 500 - 1,300 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก กรกฎาคม - สิงหาคม

กล้วยไม้ดิน ใบรูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 10-20 เซนติเมตร ช่อดอกมี 1-2 ดอก ก้านช่อยาว 12-25 เซนติเมตร ใบประดับรูปไข่ ปลายแหลม ยาว 1.5-2.8 เซนติเมตร ดอกสีขาว อมเขียวหรือน้ำตาล เส้นกลีบสีม่วง กลีบเลี้ยงบนรูปไข่กว้างเกือบกลม กว้าง 4.2-6 เซนติเมตร ปลายกลีบเป็นติ่งแหลม กลีบคู่ข้างรูปรี เว้า ยาว 2.7-3.2 เซนติเมตร กลีบดอกรูปรี ยาว 4.6-6.8 เซนติเมตร บิดเล็กน้อย ปลายกลีบมนหรือกลม ขอบกลีบบนและล่างมักมีจุดสีน้ำตาลแดง ฐานกลีบปากสีเขียวอมน้ำตาล ยาว 2.5-4.5 เซนติเมตร ขอบด้านในมีต่อม แผ่นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปรี ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ปลายจักโค้งคล้ายรูปเคียว มีขนสั้นนุ่ม รังไข่รวมกันยาว 3-6.5 เซนติเมตร พบที่ลาว และกัมพูชา ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นได้รุ่มเงาในป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ความสูง 300-1300 เมตร แยกเป็น var. *potentianum* (O. Gruss & Roeth) P. J. Cribb ไม่มีต่อมบนกลีบดอก เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย แต่ไม่ทราบถิ่นที่อยู่ในธรรมชาติ และ var. *sublaeve* (Rchb.f.) P. J. Cribb หรือเอื้องคางกบใต้ กลีบเลี้ยงบนขนาดเล็กกว่า กลีบดอกไม่บิดงอและมีจุดสีน้ำตาลแดงที่ขอบบน พบที่คาบสมุทรมลายูตอนบน และภาคใต้ของไทย ขึ้นตามป่าละเมาะ ความสูง 700-950 เมตร