




เสือแพ้ว

ชื่ออื่นๆ :

Pomatocalpa maculosum (Lindl.) J.J.Sm. subsp. *maculosum*

ช่วงระยะออกดอก : พฤศจิกายน-ธันวาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ลำต้นยึดยาวแล้วโค้งเอน ใบ รูปขอบขนาน คล้ายแผ่นหนัง ขนาด 1.3-1.8 x 15-17 ซม. เรียงสลับ ปลายใบหยักเว้าเป็น 2 พู กลมมน บรรจบไม่เท่ากัน **ช่อดอก** ออกตามข้อ ก้านช่อดอกเรียว แข็ง ยึดยาว แตกกิ่งได้หลายชั้น แกนกลางช่อดอก ยาว 2-3.5 ซม. มีสีม่วงแต้มเขียวทั้งก้านช่อและแกนกลางดอก ติดดอกมาก ก้านดอกย่อยสีเขียว ติดดอกในลักษณะกลับหัว (คางดอกอยู่ด้านบน) **กลีบเลี้ยงและกลีบดอก** สีเหลืองซีด แต้มสีม่วงที่โคนกลีบ **กลีบเลี้ยงบน** ยาว 3.9-5.1 มม. **กลีบเลี้ยงคู่ล่าง** ยาว 4-5.5 มม. แคบกว่า **กลีบดอก** ขนาด 1.9-2.5 x 3.4-4.5 มม. คางดอกเป็นถุง กว้างแต่สั้น ก้นถุงแผ่กว้างกว่าปากถุง เว้าเป็น 2 พูเล็กน้อย ปลายโค้งไปด้านหลัง ปลายคางกลมมนและมีสีม่วงแต้ม **ปลายกลีบปาก** เชื่อมต่อจากปากถุงด้านบนของคางดอก รูปสามเหลี่ยม ปลายมน หูกลีบด้านข้าง ภายในคางดอกฝั่งผนังด้านใน มีรยางค์รูปขอบขนานปลายเว้าลง ติดอยู่และยื่นส่วนปลายขึ้นมาเกือบเสมอขอบปากถุงของคางดอก เส้นเกสรสั้น ฝักปิดอับเรณูรูปจะงอยปากนก ด้านข้างเส้นเกสรทั้ง 2 ข้าง มีรยางค์รูปตัว V ยื่นออกมาด้านหน้า



ถิ่นที่อยู่ : พบตามต้นไม้ ในป่าดิบชื้นระดับต่ำ ไม่เกิน 600 เมตร หรือป่าดิบเขาหินปูน ภายใต้ร่มเงา

