



หิวหา

Strongyleria panneae (Lindl.) Schuit., Y.P.Ng & H.A.Pedersen

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จ.สงขลา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 0 - 1,300 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก มีนาคม - พฤษภาคม

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางด้านข้าง ไม่มีลำลูกกล้วย ใบ รูปทรงกระบอก โคนใบเป็นกาบ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.6 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร มีขนนุ่มปกคลุม ขึ้นเป็นกระจุกเรียงสลับกันขึ้นไป กระจุกละ 3-4 ใบ แต่ละกระจุกอยู่ห่างกันบนเหง้าทอดเลื้อย ช่อดอก แบบช่อกระจุก ตั้งตรง มีขนปกคลุม ดอก ขนาด 0.8 เซนติเมตร มี 2-3 ดอก เรียงเวียน กลีบเลี้ยงบน รูปรีแกมรูปขอบขนาน กลีบเลี้ยงคู่ข้าง รูปรีกว้างและเบี้ยว โคนกลีบเชื่อมเป็นคางดอก ด้านหลังมีขนปุยปกคลุม กลีบดอก รูปขอบขนาน มีขนปกคลุมเล็กน้อย ทั้งห้ากลีบสีเหลืองหม่น ปลายกลีบมน กลีบปาก รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กลีบสีน้ำตาลไหม้ มีแต้มสีเหลืองหม่นที่โคนและปลายกลีบ พบในป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง และป่าสนเขา ตามที่โล่งแจ้งแสงแดดรำไรถึงแสงแดดจัดในหลายระดับความสูง