



เห็องวาว

Thrixspermum calceolus (Lindl.) Rchb.f.

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุโขทัย จ.นราธิวาส ความสูงจากระดับน้ำทะเล 50 - 2,000 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก มิถุนายน - สิงหาคม

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางปลายยอด ลำต้นยาวทอดเลื้อยหรือเกาะตามเปลือกไม้ เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 0.5 เซนติเมตร แขนงเล็กน้อย ปลายยาว 2 เซนติเมตร ใบ อวบน้ำ รูปขอบขนาน ขนาด 2-3x6-10 เซนติเมตร ทำมุมตั้งฉากกับลำต้น ฐานใบสอบแคบ บิด ปลายใบมน บรรจบไม่เท่ากัน ช่อดอก ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ออก 1-3 ช่อต่อข้อ แต่ละช่อมีดอกน้อย กาบดอกยาว 0.7 เซนติเมตร ดอกย่อย สีขาว อวบน้ำ มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยง ยาว 2.5-4 เซนติเมตร ปลายกลีบแหลม กลีบดอก มีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย กลีบปาก ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นถุง เรียว ปลายบาน มีคางดอกตื้นๆ กลมมน กลีบปากสีขาว มีขนสีส้มอมเหลืองพาดกลางกลีบปาก มีหูกลิบบากรูปรางคล้ายเขี้ยว แหลม โค้งมาด้านหน้า ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร ภายในกลีบปากที่เป็นถุง มีแผ่นเนื้อเยื่อที่คล้ายแผ่นหนัง (callus) ติดอยู่ด้านหน้าคางดอก ด้านบนสีขาว ด้านล่างมีประสีส้มอมเหลือง พบบนหิน หรือ บนต้นไม้ ภายใต้อร่มเงา ป่าดิบชื้นถึงป่าดิบเขา