



เอื้องทะวาบจิว

Thrixspermum trichoglottis (Hook.f.) Kuntze

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต จ.พังงา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 250 - 1,500 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก มกราคม - กรกฎาคม

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด รากกิ่งรากอากาศ ใบ เรียงตัวสลับ รูปขอบขนาน ปลายใบเรียวเว้าเป็นสองหยักย่อยไม่เสมอกัน ช่อดอก ออกที่ข้อ ครั้งละหลายๆ ช่อ อาจมากถึง 14 ช่อ ช่อดอกตั้งขึ้น ก้านช่อดอกสีเขียวอมเหลือง แกนช่อดอกสีเขียว ใบประดับดอกสีเขียว แหลม อวบน้ำ ก้านดอกย่อยสีเขียวอมเหลือง ดอกบานพร้อมกันทุกๆ ช่อ แต่ละช่อมีดอก 1-3 ดอก ดอก สีเหลืองอ่อนหรือขาว กลีบเลี้ยงบน รูปขอบ ขนาน ปลายงอน กลีบเลี้ยงคู่ข้าง ไม่สมมาตร กลีบดอก รูปขอบขนานปลายแหลมงอน กลีบปาก ห่อตัวคล้ายถุง มีจุดสีน้ำตาลหรือส้มแต้ม จุดนี้ อาจมีมากหรือน้อย หูกลีบปลายมนชี้ขึ้น มีขนยาวสีขาว ปลายกลีบปากเล็ก รูปสามเหลี่ยมมีขนสีขาวละเอียดสั้นๆ ขึ้นทั่ว กลางผนังด้านในของ กลีบปากมีเนื้อเยื่อสีขาว ผนังของส่วนปลายคาง ด้านในแต้มด้วยสีน้ำตาลหรือส้มอมน้ำตาล ฝาครอบกลุ่มอับเรณูสีขาว ครอบกลุ่มอับเรณูสี เหลืองใส พบบนต้นไม้ โคนป่าดิบที่ราบต่ำ