



# เอื้องเสืออุโบหอก

ชื่ออื่นๆ :

*Trichoglottis lanceolaria* Blume

ช่วงระยะออกดอก : กันยายน-พฤศจิกายน

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ต้นยาว 70 ซม. หรือมากกว่า ห้อยลง มีรากเฉพาะที่โคน ปล้องยาว 1.5 ซม. ใบ เรียงตัวสลับ กางออก รูปขอบขนาน กว้าง 0.8 ซม. ยาว 7-10 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบบิด แผ่นใบค่อนข้างหนา **ช่อดอก** เกิดที่ข้อตรงข้ามใบ แกนช่อดอกซีกแฉก **ดอก** ในช่อมี 2-4 ดอก ห้อยย่นครั้งละ 1 ดอก ก้านดอกย่อยรวมทั้งรังไข่ ยาว 0.7 ซม. ดอกบานกว้างและยาว 0.85 ซม. **กลีบเลี้ยงและกลีบดอก** สีเหลือง ด้านในแต้มด้วยสีแดงเข้มหรือแดงน้ำตาล หรือไม่มีแต้ม **กลีบเลี้ยงบน** รูปไข่กลับ โค้งไปข้างหน้า กว้างไม่ถึง 0.2 ซม. ยาว 0.4 ซม. **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** ลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับกลีบเลี้ยงบน ฐานกลีบเชื่อมและหุ้มปลายเดือยไว้ **กลีบดอก** ไม่สมมาตรลักษณะคล้ายปีกนก กว้าง 0.1 ซม. ยาว 0.3 ซม. เดือยตรง สีขาวใส ชี้ลง กว้าง 0.1 ซม. ยาว 0.3 ซม. ภายในมีขนโดยเฉพาะผนังบริเวณด้านหน้า ขอบของฐานกลีบปากมีหยักข้างละ 1 หยัก หูกลีบปากรูปสามเหลี่ยม ชี้ตรง สีขาว ปลายสีแดงเข้มเห็นไม่ชัดเจน ยาว 0.1 ซม. ปลายกลีบปากตั้งฉากกับเดือย กว้าง 0.25 ซม. มี 3 หยัก แต่ละหยักยาว 0.1 ซม. บริเวณตรงกลางของหยักกลางมีต่อมสีเหลืองเข้ม บนต่อมมีกลุ่มเนื้อเยื่อคล้ายขนสั้นๆ พาดตลอดไปจนถึงฐานของหูกลีบปากสองหยัก ด้านข้าง ปลายแหลมสีขาว เส้าเกสรสั้น ขอบยอดเกสรเพศเมียสีแดงเข้ม



**ถิ่นที่อยู่ :** พบในป่าดิบชื้น สูง 500-1,200 เมตร

