



หวายน้อย

ชื่ออื่นๆ :

Trichoglottis ventricularis Kocyan & Schuit.

ช่วงระยะออกดอก : มิถุนายน-สิงหาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้ายไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด รากอากาศ ต้นพอมแตกแขนงตั้งขึ้นหรือห้อยลง ทั้งต้นและรากพันกันยุ่ง
 ข้อยาว 1-1.5 ซม. ใบ เรียงตัวสลับ รูปขอบขนานแกมใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนใบเป็นกาบหุ้มต้น แผ่นใบเรียบ สีเขียวอ่อน
 แด้มด้วยสีม่วงแดง กว้าง 0.6 ซม. ยาวได้ถึง 12 ซม. ข้อดอกสั้นมากออกที่ข้อ ออกครั้งละหลายๆ ข้อ แต่ละข้อมีดอก 1 ดอก
 ดอก สีเหลือง กว้าง 0.3 ซม. ยาว 0.6 ซม. **กลีบเลี้ยงบน** รูปไข่กลับ ตัวกลีบเป็นร่องงุ้ม ปลายกลีบแหลม กลีบกว้าง 0.2 ซม. ยาว 0.4
 ซม. **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** รูปใบหอกแกมรูปไข่ ตัวกลีบงอแงและเป็นร่องเช่นกัน กลีบกว้างไม่ถึง 0.2 ซม. ยาว 0.35 ซม. **กลีบดอก** รูปไข่กลับ
 ปลายเรียวแหลม กว้าง 0.15 ซม. ยาว 0.3 ซม. กลีบปากสีขาว เรียวแหลมโค้งขึ้น ยาว 0.2 ซม. ตัวกลีบเป็นร่อง ปลายเว้าหยัก
 คล้ายซี่ฟันสั้นๆ 2 อัน **กลีบปาก** บาง ชี้ตรง ยาว 0.1 ซม. เดือยสีขาว บางใส ลักษณะคล้ายถุงเท้า ยาว 0.2 ซม. ภายในมีขนยาว
 เป็นผนังกัน เล้าเกสรสีขาว ฝากรอบกลุ่มอัษฎาสีครีม ครอบกลุ่มอัษฎา 4 กลุ่ม



ถิ่นที่อยู่ : พบในประเทศไทย และมาเลเซีย ตามป่าหินปูน ที่ความสูงถึง 1,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล

