



มรียาปวาย

Trichotosia pulvinata (Lindl.) Kraenzl.

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จ.ระนอง ความสูงจากระดับน้ำทะเล 200 - 1,200 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก มิถุนายน - กันยายน

เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางด้านข้าง รากสีน้ำตาลแดง ออกเป็นกระจุกที่โคนต้นลำต้นขึ้นชิดกันเป็นกอขนาดใหญ่ เหยียงหรือห้อยลง สีเขียวเข้ม รูปทรงกระบอก เรียวยาวและแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มิลลิเมตร ยาว 10-60 เซนติเมตร ส่วนโคนเรียวแคบกว่าส่วนปลาย ผิวเรียบ มีกาบใบสีน้ำตาลแดงหุ้มตามปล้องตั้งแต่โคนถึงเกือบกลางลำต้น ใบ เดี่ยว มีจำนวนมาก ออกตลอดต้นยกเว้นบริเวณโคนต้น เรียงสลับ รูปใบหอก กว้าง 1-3 เซนติเมตร ยาว 4.5-10 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนแผ่เป็นกาบหุ้มรอบลำต้น ขอบเรียบ แผ่นใบหนาและอวบน้ำ มีขนนุ่มสีน้ำตาลแดงหนาแน่นทั้ง 2 ด้าน เส้นใบขนานจากโคนใบสู่ปลายใบ ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบตั้งแต่กลางลำต้นถึงใกล้ปลายยอด ดอกสีขาวนวลหรือสีขาวอมชมพู ผิวด้านนอกของกลีบเลี้ยงบนและกลีบเลี้ยงข้างมีขนนุ่มสีน้ำตาลแดงหนาแน่น ผลแบบผลแห้งแตก รูปทรงรีแกมรูปทรงกระบอก เมล็ดขนาดเล็ก มีจำนวนมาก พบในรัฐอัสสัม เทือกเขาหิมาลัยตะวันออก ภูฏาน เมียนมาร์ มาเลเซีย กัมพูชา ลาว มณฑลยูนนานของจีน และเวียดนาม ประเทศไทยพบตามป่าดิบเขา ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้